



# HAF- OG VATNARANNSÓKNIR

*MARINE AND FRESHWATER RESEARCH IN ICELAND*

Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna  
á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021

Eydís Salome Eiríksdóttir, Hafrannsóknastofnun  
Svava Björk Þorláksdóttir, Veðurstofu Íslands

HAFNARFJÖRÐUR - JÚNÍ 2022



## Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021

---

Eydís Salome Eiríksdóttir, Hafrannsóknastofnun  
Svava Björk Þorláksdóttir, Veðurstofu Íslands







## Upplýsingablað

**Titill:** Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021

**Höfundar:** Eydís Salome Eiríksdóttir og Svava Björk Þorlaksdóttir

<b>Skýrsla nr:</b> HV 2022-20	<b>Verkefnisstjóri:</b> Eydís Salome Eiríksdóttir	<b>Verknúmer:</b> 15193
<b>ISSN</b> 2298-9137	<b>Fjöldi síðna:</b> 45	<b>Útgáfudagur:</b> 10. júní 2022
<b>Unnið fyrir:</b> Landsvirkjun Umhverfisstofnun	<b>Dreifing:</b> Opið	<b>Yfirfarið af:</b> Rakel Guðmundsdóttir

### Ágrip

Í þessari skýrslu eru teknar saman niðurstöður mælinga á rennsli, uppleystum eftum og svifað í Sogi við Þrastarlund, Ölfusá við Selfoss og Þjórsá við Urriðafoss. Niðurstöðurnar eru birtar í töflum og myndum í viðauka og þær ræddar í texta. Vöktunin er unnin fyrir Landsvirkjun og Umhverfisstofnun og er þessi áfangaskýrsla ætluð til að gera grein fyrir niðurstöðum frá árinu 2021. Þær niðurstöður eru bornar saman við eldri niðurstöður en vöktunin hefur staðið frá árinu 1996 í Ölfusá og Þjórsá og frá 1998 í Sogi. Gögnin nýtast til að gera grein fyrir efnastyrk og framburði íslenskra straumvatna í evrópska gagnagrunna auk þess að vera mikilvæg til að meta breytileika efnastyrks innan árs og á milli ára í íslenskum straumvötnum. Einnig nýtast gögnin til að meta ástand þessara straumvatna m.t.t. efnasamsetningar þeirra miðað við það sem sett hefur verið fram í lögum um stjórn vatnamála (nr. 36/2011) og reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999).

### Abstract

*This report summarizes the results of measurements of river discharge, dissolved substances, and suspended solids in samples collected during different seasons in 2021 in Sog at Þrastarlund, Ölfusá at Selfoss and Þjórsá at Urriðafoss. The results are published in tables and figures in the appendix and are discussed in the text. The monitoring is carried out for Landsvirkjun and the Environmental Agency of Iceland. In the report the results from 2021 are compared with older results, but the monitoring has been ongoing since 1996 in Ölfusá and Þjórsá and since 1998 in Sog. The data is used to account for the chemical concentration and fluxes of Icelandic rivers into European databases, in addition of being important for assessing the seasonal and long-term variability of riverine constituents in Icelandic streams. The data is fit for purpose to assess the physico-chemical status of the monitored rivers according to the WFD.*

**Lykilord:** Efnasamsetning, straumvötn, stjórn vatnamála, efnaframburður, næringarefni, snefilefni, aðalefni, eðlisefnafræðilegir gæðaþættir, OSPAR. *Riverine chemical composition, riverine*

*fluxes, nutrients, trace elements, major element, physico-chemical quality elements*

**Undirskrift verkefnisstjóra:**

Fyndi Salome Einarsdóttir

**Undirskrift forstöðumanns sviðs:**

Gudni Gudbergsson

<b>Efnisyfirlit</b>	<b>Bls.</b>
1 Inngangur .....	1
2 Eiginleikar vatnasviðanna .....	3
2.1 Sog .....	3
2.2 Ölfusá .....	3
2.3 Þjórsá .....	4
3 Aðferðir .....	6
3.1 Sýnasöfnun .....	6
3.2 Efnagreiningar .....	7
3.3 Reikningar á efnaframburði .....	8
4 Niðurstöður og umræður .....	9
4.1 Gæði niðurstaðna og samanburður við eldri mælingar .....	9
4.2 Meðalstyrkur efna í straumvötnunum .....	10
4.3 Breytingar á efnastyrk með tíma .....	11
4.4 Framburður efna í straumvötnunum .....	13
4.5 Vatnsgæði í vöktuðum straumvötnum á Suðurlandi .....	14
5 Lokaorð .....	16
þakkir .....	16
Heimildir .....	17
VÍÐAUKI .....	20

## **Myndaskrá**

Mynd 1. Vatnasvið og staðsetningar sýnatökustöva á Suður- og Vesturlandi .....	2
Mynd 2. Sog við Prastarlund.....	26
Mynd 3. Styrkur efna í tímaröð í Sogi við Prastarlund 1998–2021.....	28
Mynd 4. Styrkur efna í tímaröð í Sogi við Prastarlund 1998–2021.....	29
Mynd 5. Samband rennslis og efnastyrks í Sogi við Prastarlund 1998–2021 .....	30
Mynd 6. Samband rennslis og efnastyrks í Sogi við Prastarlund 1998–2021 .....	31
Mynd 7 A-D. Sýnasöfnun í Ölfusá .....	32
Mynd 8. Styrkur efna í tímaröð í Ölfusá við Selfoss 1996–2021 .....	34
Mynd 9. Styrkur efna í tímaröð í Ölfusá við Selfoss 1996–2021 .....	35
Mynd 10. Samband rennslis og efnastyrks í Ölfusá við Selfoss 1996–2021 .....	36
Mynd 11. Samband rennslis og efnastyrks í Ölfusá við Selfoss 1996–2021 .....	37
Mynd 12 A-D. Sýnasöfnun í Þjórsá.....	38
Mynd 13. Styrkur efna í tímaröð í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021 .....	40
Mynd 14. Styrkur efna í tímaröð í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021 .....	41
Mynd 15. Samband rennslis og efnastyrks í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021 .....	42
Mynd 16. Samband rennslis og efnastyrks í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021 .....	43


## **Töfluskrá**

Tafla 1a. Langtíma meðalefnasamsetning og langtíma meðalrennslí vaktaðra straumvatna á Suðurlandi til ársins 2021.....	21
Tafla 2a. Árlegur framburður straumvatna á Suðurlandi (tonn/ár). ....	23
Tafla 3. Niðurstöður mælinga á rennslí og efnastyrk í Sogi, Ölfusá og Þjórsá í tímaröð árið 2021 .....	25
Tafla 4. Efnasamsetning, rennslí og aurburður Sogs við Prastarlund 2020-2021.....	27
Tafla 5. Efnasamsetning, rennslí og aurburður Ölfusár við Selfoss 2020-2021.....	33
Tafla 6. Efnasamsetning, rennslí og aurburður Þjórsár við Urriðafoss 2020-2021 .....	39
Tafla 7. Efri umhverfismörk málma og næringarefna í hverjum umhverfisflokkí.....	44
Tafla 8. Vatnsgæði í Sogi, Ölfusá og Þjórsá árið 2021 .....	44
Tafla 9. Ástand vaktaðra straumvatna á Suðurlandi 2021 m.t.t. eðlisefnafræðilegra gæðaþáttá .....	44
Tafla 10. Næmi efnagreiningaraðferða og hlutfallsleg skekkja mælinga. ....	45

## **1 Inngangur**

Vöktun á efnastyrk, rennsli og efnaframburði straumvatna á Suðurlandi hófst árið 1996 og hefur staðið óslitin síðan þá. Upphaflega beindist vöktunin að mörgum straumvötnum í Árnes- og Rangárvallasýslu og var söfnunartíðnin nokkuð þétt framan af, eða 11 sinnum á ári fyrstu tvö árin. Síðan þá hefur vöktuðum straumvötnum fækkað og tíðnin minnkað. Frá árinu 2003 hafa þrjú straumvötn verið vöktuð; Sog, Ölfusá og Þjórsá, og hefur söfnun farið fram í þeim fjórum sinnum á ári, jafndreift yfir árið. Jarðvíssindastofnun Háskólags (áður Raunvíssindastofnun) og Veðurstofa Íslands (áður Vatnamælingar) voru framkvæmdaraðilar vöktunarinnar til ársins 2019 og var verkið unnið fyrir Umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun (áður Hollstuvernd; AMSUM) og Landsvirkjun. Tilgangur verkefnisins var að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslendinga um takmörkun á mengandi eftirum sem berast frá landi til sjávar (OSPAR, The Oslo and Paris Commission 1995). Niðurstöður rannsóknarinnar hafa einnig nýst til að fá almenna þekkingu á efnastyrk og framburði efna á föstu og uppleystu formi í straumvötnum á Íslandi og hefur veitt mikilvægar upplýsingar um árstíðabundinn- og langtíma breytileika í straumvatni á Íslandi, m.a. með samanburði við rannsókn sem fram fór á Suðurlandi á árunum 1972–1973 (Halldór Ármansson o.fl. 1973; Sigurjón Rist 1974). Um þennan hluta vöktunarinnar hafa verið skrifaðar árlegar skýrslur þar sem niðurstöður hvers árs eru tíundaðar (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 1997-2008; 2017-2019; Eydís Salome Eiríksdóttir 2008-2016; Deirdre Clark o.fl. 2020).

Árið 2020 færðist framkvæmd efnavöktunar frá Jarðvíssindastofnun yfir til Hafrannsóknastofnunar og er verkið sem áður samvinnuverkefni við Veðurstofu Íslands. Leitast hefur verið við að framkvæmdin sé sambærileg við fyrra rannsóknartímabil, bæði hvað varðar sýnasöfnun og efnagreiningar. Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir niðurstöðum mælinga á styrk uppleystra og fastra efna í sýnum sem safnað var fjórum sinnum á árinu 2021 í Sogi við Þrastarlund, Ölfusá við Selfoss og Þjórsá við Urriðafoss. Aðferðum við sýnasöfnun og efnamælingar er lýst og niðurstöður kynntar í töflum og myndum, auk þess sem fjallað er um þær í viðeigandi köflum. Niðurstöður frá árunum 2020–2021 eru sýndar á myndum ásamt eldri niðurstöðum til að draga fram hvort breytingar hafi orðið á vöktunartímanum.



VHM	Nafn	Vatnsvið (km <sup>2</sup> )	Þar af á jöcli (km <sup>2</sup> )
30	Þjórsá	7314	960
64	Ölfusá	5662	628
128	Norðurá	513	0
271	Sogið	1143	34
	Steingrímsstöð	949	34

Mynd 1. Vatnsvið og staðsetningar sýnatökustöðva á Suður- og Vesturlandi. Þessi rannsókn beindist að þremur stöðvum, Þjórsá (vhm 30), Ölfusá (vhm 64) og Sogi (vhm 271).

## 2 Eiginleikar vatnasviðanna

### 2.1 Sog

Vatnasvið Sogs er 1143 km<sup>2</sup> ofan við sýnasöfnunarstaðinn við Þrastarlund og nær það upp undir Langjökul. Berggrunnurinn er gerður úr basalthraunlögum sem eru um 9000 ára gömul og mynduðust við gos í Skjaldbreið. Svæðið er uppbrotið vegna jarðskorpuhreyfinga á rekbeltunum sem er því hriplekt (Freysteinn Sigurðsson o.fl. 2006) og því er nánast ekkert yfirborðsvatn þar að finna en hins vegar er mikið af grunnvatni. Rennsli og efnasamsetning grunnvatnsins er stöðugt (Jón Ólafsson 1992, Hákon Aðalsteinsson o.fl. 1992, Eydís Salome Eiríksdóttir og Sigurður Reynir Gíslason 2020) sem einnig einkennir vatnið sem rennur í farvegi Sogsins, en Sogið er hreinræktuð lindá. Jarðvegur á vatnasviðinu er víða þunnur og einkennist landið víða af ógrónum hraunum og söndum. Annars staðar einkennist jarðvegurinn af lágu kolefnisinnihaldi og litlum jarðraka (brúnjörð) (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson 2009).

Rennsli Sogs er stýrt þar sem vatnshæð Þingvallavatns er haldið uppi vegna raforkuframleiðslu í Sogsvirkjunum. Þar er um að ræða rennslisvirkjanir og engin vatnsmiðlun á sér stað á vatnasviðunum. Áhrif rennslisstýringarinnar í Sogi hefur í gegn um tíðina verið þó nokkur en undanfarin ár hefur verið leitast við að minnka tíðni snöggra rennslisbreytinga (Magnús Jóhannsson o.fl. 2011; Auður Atladóttir o.fl. 2018).

Samkvæmt flokkun straumvatna sem gerð hefur verið á grundvelli laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011, er Sog við Þrastarlund í vatnagerð RL2 sem er bergvatn á láglendi, á yngri berggrunni, án áhrifa votlendis eða jöklar á vatnasviði (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020a; vatnavefsja.vedur.is). Niðurstöður þeirra mælinga sem birtast í þessari skýrslu geta nýst við ástandsflokkun Sogs 1 (nr. 104-897-R) með tilliti til eðlisefnafræðilegra gæðapátta (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020b).

### 2.2 Ölfusá

Vatnasvið Ölfusár er 5662 km<sup>2</sup> ofan við söfnunarstaðinn á brúnni við Selfoss. Vatnasviðið er með stærri vatnasviðum landsins og skiptist upp í tvö mjög ólík vatnasvið Hvítár og Sogs. Ölfusá er aðallega blanda af jökulá og lindá, sem hefur áhrif á náttúrulegt rennslismynstur hennar. Jökulvatn streymir frá Langjökli um Hvítárvatn og niður farveg Hvítár. Lindarvatn streymir hins vegar úr Þingvallavatni um Sog og sameinast Hvítá neðan við Þrastarlund og heitir áin eftir það Ölfusá. Jökulþátturinn er mest áberandi á sumrin á meðan jökulbráð er mest en lindarvatnspátturinn nemur um þriðjungi vatnsmagns Ölfusár á veturna og veldur því að Ölfusá er alltaf vatnsmikil, hvort sem er að vetri eða sumri.

Efri hluti vatnasviðs Ölfusár (vatnasvið Hvítár) er hulinn basalthraunlögum og móbergi yngri en 1,8 milljón ára en á neðri hluti vatnasviðsins eru yngri basalthraun, þar á meðal Eldborgarhraun (5200 ára) (Árni Hjartarson 1997) og Þjórsárhraun (8700 ára) (Árni Hjartarson, 2001), og lausum jarðlögum. Algengast er að jarðvegurinn ofantil á vatnasviðinu sé ólifrænn (lágt kolefnisinnihald) og jarðvegsraki lítill (brúnjörð) en þegar neðar dregur á vatnasvið Ölfusár eykst bæði kolefnisinnihald jarðvegsins og jarðvegsraki (votjörð-brúnjörð) (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson 2009).

Rennsli Hvítár er óraskað af mannavöldum en rennsli Sogs er stýrt þar sem vatnshæð Þingvallavatns er haldið uppi vegna raforkuframleiðslu í Sogsvirkjunum. Þar eru rennslisvirkjanir en engin vatnsmiðlun á sér stað á vatnasviði Þingvallavatns og Sogs. Rennslisstýring í Sogi hefur því lítil áhrif á rennsli Ölfusár. Sogsvirkjanir hafa heldur ekki teljanleg áhrif á framburð svifaurs í Ölfusá þar sem lang mestur hluti þess svifaurs sem berst fram með Ölfusá er ættaður úr Langjökli og berst niður farveg Hvítár.

Samkvæmt flokkun straumvatna sem gerð hefur verið á grundvelli laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011, er Ölfusá í vatnagerð RL2, sem er bergvatn á láglendi, á yngri berggrunni, án áhrifa votlendis eða jöklar á vatnasviði (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020a; vatnavefsja.vedur.is). Niðurstöður mælinga úr Ölfusá sem birtast í þessari skýrslu geta nýst við ástandsflokkun Ölfusár (103-975-R) með tilliti til eðlisefnafræðilegra gæðapáttta (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020b).

## 2.3 Þjórsá

Þjórsá er lengsta vatnsfall á Íslandi, alls um 230 km. Vatnasvið hennar er 7314 km<sup>2</sup> ofan við Urriðafoss og er það næststærsta vatnasvið á Íslandi, á eftir Jökulsá á Fjöllum. Þjórsá ofan Sultartanga skiptist í þrjú meginvatnasvið; Efri Þjórsá, Köldukvísl og Tungnaá. Neðan við Sultartanga sameinast þessi vatnsföll og renna saman til sjávar. Elsti hluti berggrunnsins á vatnasviði Þjórsár er Hreppamyndunin sem er samheiti yfir elsta hluta berggrunnsins á Suðurlandi. Hreppamyndunin myndaðist fyrir 0,8 til 3 milljónum ára og skiptast þar á móbergmyndanir frá jökluskeiðum og hraun og setlög frá hlýskeiðum. Útbreiddasta jarðmyndunin á vatnasviði neðri hluta Þjórsárvæðisins er Þjórsárhraunið sem er basalthraun sem kom upp fyrir um 8700 árum (Árni Hjartarson, 2001). Efri hluti vatnasviðsins er lítt gróin mela- og sandjörð en neðar á vatnasviðinu er brúnjörð algeng (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson 2009; Guðrún Gísladóttir o.fl. 2014).

Þjórsá er blanda af jökulá, dragá og lindá, sem hefur áhrif á náttúrulegt rennslismynstur hennar. Jökulvatn streymir frá Hofsjökli í farvegi Þjórsár og frá Vatnajökli í farvegum Tungnaár og Köldukvíslar. Jökulrennslið er lítið sem ekkert á veturna en mikið á sumrin þegar jökulbráð

er mikil. Margar misstórar dragár falla til Þjórsá og hafa þær mjög breytilegt rennsli eftir árum og árstíðum. Helstu dragár sem falla til Þjórsá eru Fossá, Sandá, Þverá, Minnivallalækur og Kálfá. Lindarvatn streymir víða inn í ár og vötn á vatnasviðinu, einkum þar sem berggrunnurinn er gropinn og grunnvatnsstaða há. Veiðivatnaklasinn er í lægðum sem skera grunnvatnsborðið og þaðan streymir mikið vatn til Tungnaár. Lindarvatn flæðir einnig fram við jaðra Þjórsárhrauns að farvegi Þjórsár en rennsli þessara linda getur verið breytilegt, sem og hæð gunnvatnsyfirborðs á svæðinu (Árni Hjartarson, 2001; Snævarr Örn Georgsson, 2016). Sýnt hefur verið fram á að þáttur grunnrennslis er 53% af heildarrennsli Tungnaár ofan vatnshæðarmælisins við Maríufossa (Snævarr Örn Georgsson, 2016). Afrennsli á vatnasviði Þjórsár stjórnast af jökulbráð, setmiðluðu dragavatni og lindarvatni af treglekum lindarvatnssvæðum (Freysteinn Sigurðsson o.fl., 2006).

Náttúrulegu rennsli og framburði svifaurs í Þjórsá hefur verið breytt með gerð miðlunarlóna sem safna vatni sem notað er til rafmagnsframleiðslu. Meðalársrennsli er óbreytt en árstíðabundinn breytileiki er minni en hann var fyrir virkjun, þar sem lágrennsli hefur aukist en hárennsli minnkað neðarlega á vatnasviðinu (t.d. Eydís Salome Eiríksdóttir 2017). Framburður svifaurs með Þjórsá til sjávar hefur minnkað verulega vegna söfnunar aurs í lón á efri hluta vatnasviðs Þjórsár, Tungnaár og Köldukvíslar. Miðað við niðurstöður svifaursmælinga frá 2001–2010 er framburður svifaurs í Þjórsá við Urriðafoss aðeins 39% (1,2 milljón tonn, Esther Hlíðar Jenssen o.fl., 2013) af því sem hann var fyrir virkjanir, 1963–1970 (3,1 milljón tonn/ár, Haukur Tómasson, 1982).

Samkvæmt flokkun straumvatna sem gerð hefur verið á grundvelli laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011, er Þjórsá í vatnagerð RG, jökulvötn (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020a; vatnavefsja.vedur.is). Niðurstöður mælinga úr Þjórsá sem birtast í þessari skýrslu geta nýst við ástandsflokkun Þjórsár 1 (103-663-R) með tilliti til eðlisefnafræðilegra gæðapátta (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020b).

## 3 Aðferðir

### 3.1 Sýnasöfnun

Sýnum var safnað í Sogi við Þrastarlund ( $64,00504^{\circ}\text{N}$ ,  $20,97342^{\circ}\text{V}$ ), Ölfusá af brú við Selfoss ( $63,93865^{\circ}\text{N}$ ,  $21,00463^{\circ}\text{V}$ ) og Þjórsá af bakka við gömlu brúna á þjóðvegi nr. 1 (63,93143,  $20,64948^{\circ}\text{V}$ ) (Þjórsá við Urriðafoss) (mynd 1). Sýnum var safnað í hreina plastfötu og hellt í 5 l plastbrúsa. Áður höfðu fatan og brúsinn verið þvegin vandlega með árvatninu til að minnka líkur á mengun við sýnatöku.

Svifaursýni voru tekin á Suðurlandi með tvenns konar sýnatökum. Í Þjórsá við Urriðafoss voru sýnin tekin með handsýnataka (DH48) sem festur var á stöng, og sýnið tekið ýmist af nyrðri eða syðri bakka undir gömlu brúnni við Þjóðveg 1. Vitað er að sýnatakinn nær ekki út í meginál árinnar þar sem aurstyrkur er mestur og því vanmeta þessi sýni heildaraurstyrk árinnar (t.d. Jórunn Harðardóttir og Svava Björk Þorláksdóttir 2002; 2005; Esther Hlíðar Jenssen o.fl. 2013). Svifaursýnin, sem tekin voru úr Sogi og Ölfusá voru tekin með svifaursýnataka (S49) á spili úr mesta streng áんな, en hann safnar heilduðu sýni frá vatnsborði að botni og að vatnsborði á nýjan leik.

Sýni til rannsókna á uppleystum eftum í vatni voru síuð með Cellulose Acetate síum með 0,2 µm möskvastærð (porustærð), 142 mm í þvermál. Síuhaldari („In-line“) úr teflon frá Sartorius var notaður og peristaltisk dæla var notuð til að pumpa vatninu í gegn um síuna. Búnaðurinn var lofttæmdur og þveginn með a.m.k. einum lítra af árvatni áður en söfnun sýnis hófst. Sýnaflöskurnar voru allar þvegnar þrisvar sinnum með síuðu árvatni áður en sýninu var safnað til þess að minnka líkur á mengun við sýnatöku. Fyrst var árvatn síað í 300 ml brúna glerflösku fyrir mælingar á basavirkni/alkalinity. Flaskan var fyllt frá botni og upp til að minnka samskipti á milli vatns og andrúmslofts. Þá var síað í tvær 100 ml PE plastflöskur til mælinga á næringarefnum og anjónum og síðast var vatn síað í 50 ml PE plastflösku til mælinga á katjónum og snefilmálmum. Í síðustu flöskuna var bætt 0,5 ml af fullsterkri hreinsaðri saltpéturssýru ( $\text{HNO}_3$  sýru) (suprapure).

Sýni til mælinga á heildarstyrk lífræns kolefnis (TOC) var safnað í glerglas. Það sýni var ekki síað heldur var því hellt beint í sýnaglassið úr söfnunarbrúsanum og sýrt með 0,3 ml af fullsterkri saltsýru ( $\text{HCl}$  sýru). Sýni til mælinga á næringarefnum voru sett í frysti og TOC sýnið var geymt í kæli á rannsóknastofu þar til það var sent til greiningar hjá ALS í Danmörku.

### **3.2 Efnagreiningar**

Efnagreiningar voru gerðar á Hafrannsóknastofnun, Jarðvísindastofnun Háskólangs og hjá ALS í Svíþjóð og Danmörku.

Mælingar á leiðni og pH voru gerðar á söfnunarstað samtímis sýnasöfnun. Basavirkni („alkalinity“) og pH var mælt með titrur og pH-rafskauti á Hafrannsóknastofnun að loknum sýnatökuleiðangri. Endapunktur titrunar var ákvarðaður með Gran-falli (Stumm og Morgan, 1996).

Aðalefni og snefilefni voru mæld af ALS Scandinavia með ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy), ICP-MS (Mass Spectrometry with Inductively Coupled Plasma) og atómljómun; AF (Atomic Fluorescence).

Sýni til mælinga á næringarefnum og TOC voru send til ALS í Danmörku strax eftir söfnun þar sem þau voru efnagreind. Næringarefnin voru greind með sjálfvirkum litrófsmæli með viðurkenndum aðferðum (DS/EN ISO 11732:2005; DS/ISO 29441:2010; EN ISO 6878:2004). Heildarstyrkur lífræns kolefnis (TOC) var greint samkvæmt aðferð DS/EN 1484:1997 með Skalar Formacs TOC/TN Analyzer.

Styrkur anjóna (flúors, klórs og súlfats) var mældur með anjónaskilju (Dionex IC2000) á Jarðvísindastofnun Háskólangs. Alþjóðlegu staðlarnir BIGMOOSE-02 og MAURI 09 voru notaðir til kvörðunar á þeim greiningunum.

Magn svifaurs og heildarmagn leystra efna ( $TDS_{mælt}$ ) var mælt á Veðurstofu Íslands samkvæmt staðlaðri aðferð (Svanur Pálsson og Guðmundur Vigfússon 2000).

Sýnum hefur verið safnað til mælinga á brennisteinssamböndum á rannsóknatímabilinu en þau hafa ekki verið greind ennþá. Til stendur að mæla þau í samstarfi við Carl-Magnus Mört professor við Stokkhólms Háskóla en það samstarf er framhald á því sem verið hefur síðan árið 1998.

### 3.3 Útreikningur á efnaframburði

Árlegur framburður straumvatna, F, er reiknaður með eftirfarandi jöfnu eins og ráðlagt er í viðauka 2 við Óslóar- og Parísarsamþykktina (OSPAR 1995, bls. 22–27; 2014, bls 6) en þar er notast við rennslisveginn meðalstyrk efna og langtíma meðalrennsli hvers vatnsfalls eins og sýnt er í jöfnu 1.

$$F = \frac{Q_r * \sum_{i=1}^n (C_i Q_i)}{\sum_{i=1}^n Q_i} \quad (\text{jafna 1})$$

þar sem  $C_i$  er styrkur aurburðar eða leystra efna fyrir sýnið i (mg/l),  $Q_i$  er rennsli straumvatns þegar sýnið i var tekið ( $m^3/\text{sek}$ ),  $Q_r$  er langtíma meðalrennsli fyrir vatnsföllin ( $m^3/\text{sek}$ ) og n er fjöldi sýna sem safnað var á tímabilinu.



## 4 Niðurstöður og umræður

### 4.1 Gæði niðurstaðna og samanburður við eldri mælingar

Næmi efnagreiningaraðferða og upplýsingar um efnagreiningaraðferðir eru í töflu 10. Þar koma einnig fram greiningarmörk eða næmi efnagreiningaaðferða (limit of detection; LOD) fyrir hvert efni.

Hægt er að leggja mat á gæði mælinga á aðalefnum eða hvort mælingar vanti á aðalefnum eða ráðandi efnasamböndum með því að skoða hleðslujafnvægi í lausn (töflur 3–6). Ef öll aðalefni og ríkjandi efnasambönd eru greind og mólstyrkur þeirra er réttur er magn neikvæðra og jákvæðra hleðslna í vatninu jafnt. Hleðslujafnvægið (katjónir – anjónir) og hlutfallsleg skekkja er reiknað með eftirfarandi jöfnum:

$$\text{Hleðslujafnvægi} = (Na + K + 2 * Ca + 2 * Mg) - (Alkalinity + Cl + 2 * SO_4 + F) \quad (\text{jafna } 2)$$

$$\text{Mismunur (\%)} = \frac{\text{Hleðslujafnvægi}}{(k \text{ atjónir} + \text{anjónir})} * 100 \quad (\text{jafna } 3)$$

Mólstyrkur Ca, Mg og SO<sub>4</sub> er margfaldað með tveimur þar sem þær jónir eru tvígildar og vega því tvöfalt á við hinar aðal-jónirnar sem notaðar eru við reikningana (equivalent).

Mismunur katjóna og anjóna í þeim sýnum sem safnað var úr straumvötnum á Suðurlandi var að meðaltali 2,26 %. Það er sambærilegt við það sem gert hefur verið grein fyrir í fyrri skýrslum Jarðvíssindastofnunar (t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020). Almennt mældist styrkur katjóna lítillega hærri en styrkur anjóna og getur það stafað af því að mögulega verður lítilsháttar afgösun á sýnum frá því þeim er safnað þangað til alkalinity (basavirkni) er mæld. Alkalinity (basavirkni) í árvatninu er haldið uppi af bíkarbonat jónum, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, sem er sú anjón sem mest er af í vatninu. Lítilsháttar afgösun getur því valdið því að heildarstyrkur anjóna getur lækkað aðeins í vatnssýnunum.

Mikilvægt er að ekki verði mikil breyting á niðurstöðum efnavöktunar vegna breytinga við framkvæmd verksins. Við tilfærslu framkvæmdar vöktunarinnar frá Jarðvíssindastofnun Háskólans yfir til Hafrannsóknastofnunar var lögð áhersla á að öll framkvæmd væri sambærileg við það sem áður hafði verið, hvað varðar sýnatökustaði, sýnatökuaðferðir, meðferð sýna og efnagreiningar. Samanburður við eldri gögn er mikilvægur þáttur til að kanna hvernig til hefur tekist eftir að Hafrannsóknastofnun tók við framkvæmdinni. Því eru niðurstöður frá 2020 og 2021 birtar ásamt eldri niðurstöðum í myndum sem birtar eru í viðauka, tímalínur og efnalyklar úr hverju vatnsfalli sem sýnum var safnað (t.d. Sigurður Reynir

Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020). Myndrænn samanburður gefur til kynna að ekki hafi orðið miklar breytingar við tilfærslu framkvæmdarinnar frá Jarðvísindastofnun til Hafrannsóknastofnunar árið 2020 (myndir 3–6; 8–11; 13–16).

Frá árinu 2020 hefur heildarstyrkur lífræns kolefnis (TOC) verið mældur í straumvötnunum en ekki styrkur uppleysts lífræns kolefnis (DOC) og kolefnis sem bundið er í ögnum (POC). Ein ástæða þess er að erfiðlega gekk að finna efnagreiningaraðila sem hefur tök á að mæla DOC og POC í þessum sýnum. Önnur ástæða er að heildarstyrkur lífræns kolefnis (TOC) hefur verið notað til að ástandslokka straumvötn samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999).

#### **4.2 Meðalstyrkur efna í straumvötnunum**

Gerð er grein fyrir meðalstyrk efna í töflum 1a og 1b. Tafla 1a sýnir langtíma meðalstyrk frá upphafi mælinga í Sogi, Ölfusá og Þjórsá, en tafla 1b sýnir meðalstyrk frá árinu 2021. Samanburður á þessum töflum gefur til kynna hvort árið 2021 skeri sig frá langtíma meðaltalinu eða ekki. Styrkur flestra aðalefna var svipaður árið 2021 og langtímmameðalstyrkur ( $\pm 10\%$ ). Styrkur næringarefna árið 2021 var sambærilegur við langtímmameðaltal (10-20%) nema styrkur NH<sub>4</sub> og N-total sem var 25 til 70% lægri en langtímmameðaltal. Það getur stafað af tilfærslu á milli efnagreiningaraðila næringarefna sem hefur verið gerð hjá ALS í Humlebæk í Danmörku síðan 2020. Áður voru næringarefni greind hjá Jarðvísindastofnun og hjá ALS í Danderyd í Svíþjóð.

Heildarstyrkur uppleystra efna er gefinn upp í töflum 1–4. Bæði er gefinn upp mældur styrkur uppleystra efna (TDS) og reiknaður heildarstyrkur uppleystra efna skv. jöfnu 4:

Heildarmagn leystra efna (TDS: „total dissolved solids“) er hér skilgreint sem samanlagður styrkur leystra aðalefna í milligrömmum í lítra vatns (mg/l) og er reiknaður á eftirfarandi hátt;

$$TDS_{reiknað} = Na + K + Ca + Mg + SiO_2 + Cl + SO_4 + CO_3 \quad (9)$$

Heildarmagn leysts ólífraens kolefnis sem gefið er í míkrómólum DIC í hverjum lítra vatns í töflum 1, 3–6 er umreiknað í mg/l af karbónati (CO<sub>3</sub>) í jöfnu 9. Ástæðan fyrir því er að þegar heildarmagn leystra efna er mælt eftir síun í gegnum 0,45 µm möskva (porur) með því að láta ákveðið magn sýnis gufa upp, líkt og gert er þegar TDS er mælt á Veðurstofu Íslands, breytist leyst ólífraent kolefni að mestu í karbónat áður en það fellur út sem kalsít (CaCO<sub>3</sub>) og loks sem tróna (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>NaHHCO<sub>3</sub>). Áður en að útfellingu trónu kemur tapast yfirleitt töluvert af leystu koltvíoxíði (CO<sub>2</sub>) úr vatninu til andrúmslofts (Eugster 1970; Jones o.fl. 1977; Hardy og Eugster,

1970). Vegna þess að CO<sub>2</sub> tapast til andrúmslofts er TDS<sub>mælt</sub> yfirleitt alltaf minna en TDS<sub>reikn</sub> í efnagreiningartöflunum.

Hér verður fjallað um niðurstöður mælinga út frá töflu 1b sem sýnir meðaltal niðurstaðna þeirra fjögurra sýna sem safnað var á því ári frá árinu 2021. Niðurstöður einstakra mælinga eru birtar í töflum 3 – 6.

Árið 2021 var sýrustig (pH) árvatnsins að meðaltali frá 7,35 til 7,63. Hæst var pH í Sogi, þá Þjórsá og lægst var það í Ölfusá. Rafleiðni vatns (leiðni) endurspeglar hve auðveldlega vatn leiðir rafmagn og er í réttu hlutfalli við magn hlaðinna efna (jóna) í vatninu. Leiðni var 75,1 µS/cm í Sogi, 75,8 µS/cm í Ölfusá og 87,2 µS/cm í Þjórsá. Þessi munur endurspeglast í heildarstyrk uppleystra efna (TDS) sem var hæstur í Þjórsá. Styrkur aðalefnanna Na, Ca, Mg, SO<sub>4</sub>, F og heildarstyrkur ólífraens kolefnis (DIC) var hæstur í Þjórsá og mestu munaði á styrk SO<sub>4</sub> og F. Styrkur kísils (SiO<sub>2</sub>) var sambærilegur í Þjórsá og Ölfusá en lægri í Sogi. Styrkur kalíums (K) var hæstur í Sogi.

Styrkur næringarefnisins fosfórs (P-total og PO<sub>4</sub>) var hæstur í Þjórsá en heildarstyrkur köfnunarefnis (N-total) var hæstur í Ölfusá. Heildarstyrkur uppleysts ólífraens fosfórs (DIP) var mun hærri en styrkur lífræns fosfórs (DOP) í ánum. Mestur var munurinn í Sogi þar sem styrkur DIP var 37 sinnum hærri en DOP (DIP/DOP í töflum 2a og 2b). Styrkur ólífraens köfnunarefnis (DIN) var að meðaltali tvöfalt hærri í Ölfusá en í Sogi og svipaður og í Þjórsá. Styrkur lífræns köfnunarefnis (DON) var sambærilegur í Ölfusá og Þjórsá og lítillega hærri en í Sogi. Hlutfall lífræns og ólífraens köfnunarefnis (DIN/DON) var sambærilegt í Ölfusá og Þjórsá en í Sogi var 30% meira af lífrænu köfnunarefni en ólífraenu.

Styrkur flestra snefilefna var lægstur í Sogi; Al, Fe, Mn, Sr, Co, Cu, Zn, Mo og Ti. Styrkur króms (Cr) var hins vegar hæstur í Sogi. Styrkur snefilefnanna Al, Fe, Mn, Sr, As, Cu og Zn var hæstur í Ölfusá. Bergættuðu efnin B og Mo voru í hæstum styrk í Þjórsá.

Fjallað er um vatnsgæði vatnsfallanna í kafla 4.5 út frá reglugerð um varnir gegn mengun vatns og þeim viðmiðunum sem lagt hefur verið til að nota við ástandsflokkun straumvatna m.t.t. eðlisefnafræðilegra gæðapáttta vegna stjórnar vatnamála (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020b).

#### **4.3 Breytingar á efnastyrk með tíma**

Niðurstöður mælinga á rennsli, hitastigi, pH og styrk uppleystra efna og svifaurs í Sogi eru sýndar í tímaröð á myndum 3 og 4, í Ölfusá á myndum 8 og 9 og í Þjórsá á myndum 13 og 14. Niðurstöður frá 2020–2021 eru settar inn á myndina með eldri gögnum (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020) til að sjá hvort einhverjar breytingar hafi orðið á

niðurstöðum mælinga vegna þess að framkvæmd vöktunarinnar var færð frá Jarðvínsindastofnun til Hafrannsóknastofnunar í upphafi árs 2020. Lögð var áhersla á að framkvæmdin yrði sambærileg og að sýnin væru efnagreind á sömu rannsóknastöðunum. Það á við um flest efnin, nema hvað mælingar á pH, leiðni og alkalinity (basavirkni) eru nú framkvæmdar á rannsóknastofu Hafrannsóknastofnunar í stað Jarðvínsindastofnunar (tafla 9). Tímaraðirnar sem sýndar eru á ofangreindum myndum benda til að ekki hafi orðið breytingar á niðurstöðum vegna tilfærslu á vöktuninni. Niðurstöðurnar frá 2021 eru í góðu samræmi við eldri niðurstöður.

Styrkur margra uppleystra efna í Þjórsá og Ölfusá sveiflast innan árs vegna breytinga í rennsli (myndir 10, 11, 15 og 16). Styrkbreytingar af völdum rennslis eru ekki áberandi í Sogi sem er lindaá og langmest af vatninu á sér uppruna í Þingvallavatni (myndir 5 og 6). Styrkur næringarefna sveiflast innan árs vegna mismikillar upptöku frumframleiðandi lífvera á vatnasviðunum. Það er sérstaklega áberandi í styrk nítrats ( $\text{NO}_3$ ) sem sveiflast frá 3–4  $\mu\text{mol/l}$  að vetri niður að greiningarmörkum (0,14  $\mu\text{mol/l}$ ) að sumri í Ölfusá og Þjórsá. Vetrarstyrkur nítrats í Sogi er lægri, ~1  $\mu\text{mol/l}$ , vegna langs dvalartíma vatnsins í Þingvallavatni og mikillar upptöku næringarefna þar. Sumarstyrkur  $\text{NO}_3$  í Sogi er við greiningarmörk aðferðarinnar líkt og í Ölfusá og Þjórsá.

Langtímaþreytingar eru ekki áberandi í straumvötnunum. Þó eru einstaka mælingar sem virðast hafa breyst smávægilega frá því að rannsókn hófst á vatnasviðunum. Þar má fyrst nefna breytingu á pH gildi í Sogi sem hefur lækkað miðað við tímabilið 1998-2013 en er nú stöðugt í kring um 7,62. Áður var pH gildi í Sogi 7,75. Annað sem vekur athygli er að styrkur áls (Al) hefur lækkað í Sogi á sama tíma. Styrkurinn er sveiflukenndur og á árunum 1998-2013 var hann á bilinu 0,3 til 0,8  $\mu\text{mol/l}$ . Frá árinu 2014 hefur styrkurinn sveiflast minna og verið frá 0,2 til 0,5  $\mu\text{mol/l}$ . Leysni áls er mjög háð pH gildi og því kemur það ekki á óvart að álstyrkur hækkar með hækkandi pH gildi ( $R^2=0,37$ ). Sambærilega breytingu á pH gildi og styrk áls á rannsóknartímabilinu er ekki að sjá í Ölfusá eða Þjórsá, en styrkur Al er hærri í þeim ám en í Sogi (töflur 1a og 1b). Önnur breyting sem er sjáanleg á myndum 3, 8 og 13 er að það virðist sem styrkur natríums (Na) hafi hækkað lítillega (~10% að meðaltali) um svipað leyti í öllum vatnsföllunum og haldist svipaður síðan. Meðalstyrkur Na í Sogi var t.d. 395  $\mu\text{mol/l}$  1998-2013 en á tímabilinu 2014-2021 var meðalstyrkurinn 362  $\mu\text{mol/l}$ . Ekki er auðvelt að útskýra þessa breytingu nema hugsanlega með því að skipt var um efnagreiningartæki hjá ALS á þeim tíma. Það getur verið örлítill munur á niðurstöðum eftir því í hvaða tæki mælingin er gerð, þrátt fyrir að niðurstaðan sé innan skekkjumarka greiningarinnar.

Í fyrri skýrslum um efnavöktun straumvatna á Suðurlandi hefur verið sýnt fram á styrksveiflur í kísli og heildarstyrk fosfórs (t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Eyðís Salome Eiríksdóttir

og Sigurður Reynir Gíslason 2020; Deirdre Clark o.fl. 2020). Sú þróun virðist halda áfram í Sogi árið 2021 og er styrkur kísils lágur miðað við það sem hann var á árunum 2006–2018 og 2016–2018, og með því lægsta sem mælst hefur í Sogi frá upphafi mælinga 1998. Sömu sögum má segja um styrk kísils í Þingvallavatni (heimild)

#### **4.4 Framburður efna í straumvötnunum**

Straumvötn bera fram ógrynni af efni, bæði á föstu og uppleystu formi. Þessi framburður er misjafn eftir því á hvaða berggrunni vatnið rennur og er munurinn sérstaklega áberandi þar sem jöklar sverfa undirlag sitt og t.d. þar sem jarðhitavatn hefur áhrif á ferskvatn. Jökulár bera með sér mikið af svifausr miðað við aðrar ár en munurinn er ekki svo mikill þegar kemur að uppleystum efnum, nema í þeim tilvikum þar sem árnar eru undir áhrifum af jarðhita/eldvirknii. Þó má sjá mun á styrk uppleystra efna og framburði straumvatna eftir eiginleikum vatnsviða. Almennt hefur rennsli straumvatna áhrif á styrk uppleystra og fastra efna í þeim og minnkar styrkur uppleystra efna almennt í straumvötnum með auknu rennsli. Það á hins vegar ekki við um hreinar lindár, eins og Sog, þar sem uppruni lindáa er grunnvatn sem er stöðugur vatnsgeymir, og því er efnastyrkur lindáa lítið eða ekkert háð afrennsli af landi. Styrkur svifaurs eykst hinsvegar með veldisfalli með auknu rennsli, sérstaklega þar sem mikið framboð er á lausum jarðlöögum á vatnasviðunum t.d. á vatnasviðum jökuláa. Dæmi um áhrif rennslis á styrk uppleystra og fastra efna eru á myndum 5, 6, 10, 11, 15 og 16. Þar eru einnig birtar jöfnur (efnajöfnur) sem hægt er að nota til að reikna áætlaðan styrk efnanna í Sogi, Ölfusá og Þjórsá, að því gefnu að upplýsingar um rennsli (t.d. dagsmeðalrennsli) liggi fyrir. Samband rennslis og efnastyrks sem sýnt er á framangreindum myndum sýnir vel þann mun sem er á þeim ólíku straumvötnum sem hér er fjallað um, Sogi, Ölfusá og Þjórsá. Rennsli hefur lítil sem engin áhrif á styrk uppleystra efna í Sogi og áhrif af innrennsli Sogs eru vel greinanleg í Ölfusá, þar sem styrkur efna í Ölfusá breytist tiltölulega lítið með rennsli. Áhrif rennslis á efnastyrk í Þjórsá eru hins vegar mun meiri og minnkar styrkur uppleystra efna með auknu rennsli, öfugt við styrk fastra efna (svifausr og POC) sem eykst með auknu rennsli (mynd 16).

Framburður uppleystra og fastra efna er reiknaður með jöfnu 1 sem fjallað er um í kafla 3.3, og byggir á upplýsingum um styrk efna auk upplýsinga um augnabliksrennsli þegar sýnin voru tekin og langtímarennslí straumvatnanna. Í þessum kafla verður fjallað um framburð efna, á uppleystu og föstu formi, og eru niðurstöðurnar sýndar í töflum 2a og 2b. Tafla 2a inniheldur upplýsingar um langtímaframburð straumvatnanna í tonnum á ári en tafla 2b sýnir sambærilegar tölur fyrir árið 2021. Gera má ráð fyrir að niðurstöður svona reikninga sé áreiðanlegri eftir því sem mælingar hafa staðið lengur yfir vegna þess að það minnkar áhrif þeirra sýna sem tekin eru við óvenjulegar aðstæður.

Framburður uppleystra og fastra efna fer eftir tvennu; styrk efnanna og rennsli. Almennt hefur rennsli meiri áhrif á framburð en efnastyrkur. Rennsli er að meðaltali svipað í Ölfusá ( $379 \text{ m}^3/\text{s}$ ) og Þjórsá ( $360 \text{ m}^3/\text{s}$ ) og styrkur uppleystra efna yfirleitt sambærilegur (töflur 1a og 1b). Rennsli Sogs er mun minna og framburður þess því mun minni en hinna tveggja. En þrátt fyrir að rennsli og styrkur uppleystra efna sé svipaður í Þjórsá og Ölfusá er framburður uppleystra efna (TDS) þó lítillega hærri í Þjórsá en í Ölfusá, og mestu munar á framburði brennsteins (S-total og  $\text{SO}_4$ ). Framburður fosfórs (P-total) er mun hærri í Þjórsá en í Ölfusá en meira berst fram af köfnunarefni (N-total) með Ölfusá en Þjórsá. Framburður Ölfusár á þungmálum er um 26% hærri en framburður Þjórsár.

Eins og fram kemur hér að ofan eykst styrkur svifaurs með auknu rennsli þar sem burðargeta vatns eykst með veldisfalli með auknu rennsli. Áhrif rennslis á svifaursmagn eru mun meiri í Þjórsá (mynd 16) en í Ölfusá (mynd 10) og því ber Þjórsá fram mun meiri svifaur heldur en Ölfusá, eða 60% meira. Framburður svifaurs (aurburður) Þjórsár sem hér eru birtar eru sambærilegar við birt gögn frá Veðurstofu Íslands um aurburð Þjórsár (1,2 milljón tonn, Esther Hlíðar Jensen o.fl. 2013). Miðað við þessar niðurstöður svifaursmælinga er framburður svifaurs í Þjórsá við Urriðafoss aðeins um 40% af því sem hann var fyrir virkjanir, 1963–1970 (3,1 milljón tonn/ár, Haukur Tómasson, 1982).

#### **4.5 Vatnsgæði í vöktuðum straumvötnum á Suðurlandi**

Niðurstöður á efnastyrk í Sogi, Ölfusá og Þjórsá frá árinu 2021 voru notaðar til að greina vatnsgæði samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999. Samkvæmt reglugerðinni skal flokka vatn m.t.t. meðaltals þeirra niðurstaðna sem fást á einu ári og þeirra umhverfismarka sem gefin eru í fylgiskjali B í reglugerðinni (tafla 7).

Vatnsgæði vaktaðra straumvatna eru gefin upp í töflu 8. Samkvæmt ofangreindu er styrkur allra efna í Sogi sem miðað er við í reglugerðinni í umhverfisflokk I, nema styrkur króms (Cr) sem er í umhverfisflokk II, sem endurspeglar að engin/lítil hætta sé á áhrifum af málmum og næringarefnum á lífríki í Sogi. Sömu sögu má segja með Ölfusá þar sem styrkur Cr er í umhverfisflokk II en hin efnin í flokki I. Hár styrkur Cr í Sogi og Ölfusá á rætur sínar að rekja til styrks Cr í Silfru, lindarvatns sem fellur í Þingvallavatn og berst þaðan niður vatnasvið Sogs og Ölfusár (t.d. Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2019; 2020). Talið er að sá hái styrkur eigi sér náttúrulegan uppruna og hefur sú tilgáta t.d. verið studd af því að styrkur Cr í Hvítá í Borgarfirði er einnig hár, en vatnasvið Hvítár og Þingvallavatns eru nágrannar því þau ná bæði upp að Langjökli. Hár styrkur Cr í vatninu getur stafað af efnaskiptum grunnvatns við krómríkt berg á meðan vatnið rennur um grunnvatnsgeyminn.

Öll efnin í Þjórsá nema fosfat ( $\text{PO}_4$ ) falla í umhverfisflokk I en  $\text{PO}_4$  fellur í umhverfisflokk II. Styrkur  $\text{PO}_4$  í einstökum sýnum í Þjórsá sem safnað var árið 2021 var frá 0,25 – 0,94  $\mu\text{mol/l}$  sem er hár styrkur miðað við það sem gerist og gengur í fersku vatni. Það er hins vegar ekki hár fosfatstyrkur miðað við það sem algengt er að sjá í öðrum jökulám, t.d. Tungnaá (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2017) eða Jökulsá á Dal fyrir virkjun (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2003; Eyðís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2017). Talið er að hár fosförstyrkur í jökulám stafi af tvennu. Í fyrsta lagi af miklum efnaskiptum á milli vatns og finnalaðrar bergmýlsnu sem veldur uppleysingu á fosfórríku bergi, og í öðru lagi vegna lítillar upptöku frumframleiðandi lífvera á næringarefnum í jökulám vegna lítils gegnsæis í vatninu. Þetta samspil er líklegasta skýringin á því að fosfat fellur í umhverfisflokk II í Þjórsá árið 2021, frekar heldur en að það eigi sér stað einhver losun á lífrænum eftum á vatnsviði Þjórsár. Slík losun ætti þá að sjást í öðrum næringarefnum, t.d. í hærri styrk köfnunarefnis (N-total), frekar en styrk fosfórs þar sem köfnunarefnissambönd eru mun vatnsleysanlegri en fosför, sem fellur frekar út úr lausn.

Heildarstyrkur lífræns kolefnis (TOC) var 0,65 og 0,67 mg/l í Sogi og Þjórsá en 1,6 mg/l í Ölfusá. Samkvæmt því eru Sog og Þjórsá í umhverfisflokk I (<1,5 mg/l; oligotroph) og Ölfusá fellur í umhverfisflokk II (1,5-3 mg/l; Oligo-/mesotrophy) hvað varðar TOC samkvæmt reglugerð nr. 796/1999.

Árið 2011 voru sett lög á Alþingi um stjórn vatnamála, nr. 36/2011, og á grundvelli þeirra reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlöta, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun sem og reglugerð um stjórn vatnamála nr. 935/2011. Meginmarkmið lagarammans er að vernda vatn og vatnavistkerfi og tryggja gæði vatns til lengri tíma. Samkvæmt lögunum hafa verið sett fram viðmið til að nota við ástandsflokkun m.t.t. lífríkis og eðlisefnafræði vatnanna (Eyðís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020). Niðurstöður þeirra mælinga sem kynnt eru í þessari skýrslu nýtast til að meta ástand Sogs, Ölfusár og Þjórsár m.t.t. eðlisefnafræðilegra gæðaþáttu; meðaltali mælinga á pH, rafleiðni (leiðni), alkalinity (basavirkni) og styrks uppleystu næringarefnanna  $\text{NO}_3$ ,  $\text{PO}_4$  og  $\text{NH}_4$ , á ársgrundvelli. Meðaltal mælinga var notað (tafla 1b) ásamt þeim viðmiðunum sem birtar hafa verið til ástandsflokkunar straum- og stöðuvatna (Eyðís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020b) og benda niðurstöðurnar til að Sog, Ölfusá og Þjórsá séu í mjög góðu ástandi m.t.t. eðlisefnafræðilegra gæðaþáttu (tafla 9).

## 5 Lokaorð

Í þessari skýrslu er fjallað um niðurstöður mælinga á rennsli og eðlisefnafræðilegum þáttum í fjórum sýnum úr Sogi, Ölfusá og Þjórsá sem safnað var árið 2021. Niðurstöðurnar eru settar fram í töflum og á myndum í viðauka og fjallað um þær í texta. Þær eru einnig bornar saman við eldri gögn frá sömu stöðum sem settar eru fram á myndum (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020). Niðurstöðurnar benda til þess að meðalstyrkur efna árið 2021 sé sambærilegur við langtíma meðaltal efnanna (töflur 1a og 1b). Framburður uppleystra og fastra efna var reiknaður fyrir hvert vatnsfall út frá styrk efna og rennsli straumvatnanna, bæði langtíma framburður og framburður efna árið 2021 (töflur 2a og 2b). Styrkur einstakra efna breyttist ekki við tilfærslu á framkvæmd efnavöktunar á Suðurlandi frá Jarðvísindastofnun til Hafrannsóknastofnunar þar sem lögð var áhersla á að nota sömu söfnunarstaði, söfnunar- og mæliaðferðir og gert var á Jarðvísindastofnun. Athugun á vatnsgæðum Sogs, Ölfusár og Þjórsár bendir til þess að efni í þeim falli í umhverfisflokk I, nema styrkur króms (Cr) í Sogi og Ölfusá sem lendir í umhverfisflokk II og styrkur fosfórs í Þjórsá, P-total í umhverfisflokk II og PO<sub>4</sub> í umhverfisflokk III. Ástæðan fyrir því er ekki talin vera vegna álags af mannavöldum heldur frá náttúrunnar hendi.

## Þakkir

Það verkefni sem hér er kynnt er beint framhald verkefnis sem Jarðvísindastofnun Háskólans rak í samstarfi við Veðurstofa Íslands frá árinu 1996. Sá hluti sem áður sneri að Jarðvísindastofnun hefur nú verið fluttur til Hafrannsóknastofnunar. Sigurður Reynir Gíslason á Jarðvísindastofnun Háskólans var einn af frumkvöðlum verkefnisins árið 1996. Hann hefur leitt verkið allt þar til framkvæmd þess var flutt yfir til Hafrannsóknastofnunar. Honum eru færðar kærar þakkar fyrir það mikla traust sem hann hefur sýnt höfundum skýrslunnar í gegnum tíðina. Samstarfsfólk á Jarðvísindastofnun Háskólans, Veðurstofu Íslands og Hafrannsóknastofnun eru einnig færðar góðar þakkar fyrir hjálpinu og stuðninginn í gegnum tíðina. Landsvirkjun og Umhverfisráðuneytið (AMSUM) kostuðu núverandi rannsókn, og hafa fulltrúuar þessara stofnanna sýnt verkefninu mikinn áhuga og stuðning. Sérstakar þakkar fá Sveinn Kári Valdimarsson, Hákon Aðalsteinsson, Katrín Sóley Bjarnadóttir, Helgi Jensson og Ríkey Kjartansdóttir.

## Heimildir

- Árni Hjartarson. (1997). *Ölfus – Selvogur. Jarðfræðikort.* Greinargerð Orkustofnunar ÁH-97/040.
- Árni Hjartarson. (2001). *Vatnafar við Neðri-Þjórsá. Athuganir vegna virkjunarhugmynda.* OS-2001/075, 28 bls.
- Auður Atladóttir, Hugrún Gunnarsdóttir og Þórhildur Guðmundsdóttir. (2018). *Rennslis- og vatnshæðarbreytingar í Sogi neðan Írafoss 2006 – 2017.* LV-2019-009
- Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Carl-Magnus Mört, Sigurður Reynir Gíslason, og Eydís Salome Eiríksdóttir. (2020). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XXIII. Gagnagrunnur Jarðvíssindastofnunar og Veðurstofunnar.* Skýrsla Raunvíssindastofnunar Háskólangs, Reykjavík, RH-3-20, 61 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir. (2022). Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2021. Haf- og vatnarannsóknir, HV 2022-19, 32 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir. (2020a). *Lýsing á viðmiðunaraðstæðum straum- og stöðuvatna á Íslandi.* HV 2020-23/VÍ 2020-007/NÍ-20004. 86 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Agnes Katharina Kreiling, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Jón S. Ólafsson, Svava Björk Þorláksdóttir. (2020b). *Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatna á Íslandi.* HV 2020-42/VÍ 2020-009/NÍ-20010. 113 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir og Sigurður Reynir Gíslason. (2020). *Efnabúskapur Þingvallavatns.* Náttúrufræðingurinn 90 (1). Bls 65 – 79.
- Eydís Salome Eiríksdóttir. (2017). *Áhrif virkjana á rennsli og vatnalíf á vatnsviði Þjórsár og Tungnaárá.* Haf- og vatnarannsóknir, HV 2017-036, ISSN nr. 2298-9137. 105 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Eric H. Oelkers, Jórninn Hardardottir, Sigurdur Reynir Gíslason. (2017). The impact of damming on riverine fluxes to the ocean: A case study from Eastern Iceland. *Water Research* 113, bls 124 – 138.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Kristjana G. Eyþórsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2008). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XI.* RH-05-2008, 50 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Sigríður Magnea Óskarsdóttir, Njáll Fannar Reynisson og Peter Torssander. (2009). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XII.* RH-21-2009, 52 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2010). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIII.* RH-22-2010, 45 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2011). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIV.* RH-05-2011, 46 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2012). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XV. Gagnagrunnur Jarðvíssindastofnunar og Veðurstofunnar.* RH-06-2012, 52 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir og Sigurður Reynir Gíslason. (2013). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVI. Gagnagrunnur Jarðvíssindastofnunar og Veðurstofunnar.* RH-14-2013, 70 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir og Sigurður Reynir Gíslason. (2014). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVII. Gagnagrunnur Jarðvíssindastofnunar og Veðurstofunnar.* RH-03-2014, 67 bls.
- Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir og Sigurður Reynir Gíslason. (2015). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVII. Gagnagrunnur Jarðvíssindastofnunar og Veðurstofunnar.* RH-03-2014, 67 bls.

Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir og Sigurður Reynir Gíslason. (2016). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIX*. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-03-2016, 65 bls.

Esther Hlíðar Jensen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Snorri Zóphóníasson og Sigríður Magnea Óskarsdóttir. (2013). *Heildarframburður í neðri hluta Þjórsár árin 2001–2010*. VÍ 2013-007, 103 bls.

Freysteinn Sigurðsson, Jóna Finndís Jónsdóttir, Stefanía Guðrún Halldórsdóttir & Þórarinn Jóhannsson. (2006). *Vatnafarsleg flokkun vatnsvæða á Íslandi: hvernig bregðast landsvæði við úrkomu og miðla henni?* Orkustofnun, Vatnamælingar, OS-2006/013. Unnið fyrir Orkumálasvið Orkustofnunar.

Guðrún Gísladóttir, Utra Mankasingh and Jóhann Pórsson. (2014). *Physical and chemical soil properties of different land cover types, related to soil carbon, at Sporðöldulón*. Skýrsla Raunvísindastofnunar, RH-06-2014. 33 bls.

Halldór Ármanнsson, Helgi R. Magnússon, Pétur Sigurðsson og Sigurjón Rist. (1973). *Efnarannsókn vatna. Vatnsvið Hvítár – Ölfusá; einnig Þjórsár við Urriðafoss*. Orkustofnun, Os – RI, Reykjavík, 28 bls.

Hákon Aðalsteinsson, Pétur M. Jónasson og Sigurjón Rist. (1992). Physical characteristics of Thingvallavatn, Iceland. *Oikos* 64: 1-2. Bls 121–135.

Haukur Tómasson. (1982). Áhrif virkjunarframkvæmda á aurburð í Þjórsá. Skýrsla Orkustofnunar, OS82044, 39 bls.

Jórunn Harðardóttir og Svava Björk Þorláksdóttir. (2002). *Total sediment transport in the lower reaches of Þjórsá at Krókur*. Orkustofnun, OS-2002/020, 50 bls.

Jón Ólafsson. (1992). Chemical characteristics and trace elements of Thingvallavatn. *Oikos* 64 (1-2). Bls 151–161.

Jórunn Harðardóttir og Svava Björk Þorláksdóttir. (2005). *Total sediment transport in the lower reaches of river Þjórsá. Results from the year 2004*. Orkustofnun, OS-2005/010, 59 bls.

Magnús Jóhannsson, Guðni Guðbergsson og Jón S. Ólafsson. (2011). *Lífríki Sogs. Samantekt og greining á gögnum frá árunum 1985 – 2008*. Skýrsla Veiðimálastofnunar VMST/11049. 111 bls.

OSPAR, Oslo and Paris Commissions. (1995). *Implementation of the Joint Assessment and Monitoring Programme, Appendix 2, Principles of the Comprehensive Study on Riverine Inputs*. <https://www.ospar.org/work-areas/cross-cutting-issues/jamp>. Sótt á vefinn 16.06.2021

OSPAR, Oslo and Paris Commissions. (2014). Riverine Inputs and Direct Discharges Monitoring Programme (RID). HASEC 14/14/1, Annex 8. <https://www.ospar.org/work-areas/hasec/hazardous-substances/rid>. Sótt á vefinn 16.06.2021

Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson. (2009). *Íslenskt jarðvegskort*. Náttúrufræðingurinn 78 (3–4): 141–153.

Sigurjón Rist. (1974). *Efnarannsókn vatna. Vatnsvið Hvítár – Ölfusá; einnig Þjórsár við Urriðafoss*. Orkustofnun, Reykjavík, OS-86070/VOD-03, 67 bls.

Sigurður R. Gíslason, Jón Ólafsson og Árni Snorrason. (1997). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi*. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar, Hafrannsóknastofnunar og Orkustofnunar. RH-25-97, 28 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Jón Ólafsson, Árni Snorrason, Ingvi Gunnarsson og Snorri Zóphóníasson. (1998). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, II*. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar, Hafrannsóknarstofnunar og Orkustofnunar. RH-20-98, 39 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eyðís Salome Eiríksdóttir, Sverrir Óskar Elefsen, Ásgeir Gunnarsson og Peter Torssander. (2000). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, III*. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. RH-13-2000, 32 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eyðís Salome Eiríksdóttir, Sverrir Óskar Elefsen, Ásgeir Gunnarsson og Peter Torssander, 2001. *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, IV*. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. RH-06-2001, 36 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eyðís Salome Eiríksdóttir, Bergur Sigfússon, Sverrir Óskar Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Ásgeir Gunnarsson og Peter Torssander. (2002). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, V*. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. RH-12-2002, 36 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir, Bergur Sigfússon, Sverrir Óskar Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Ásgeir Gunnarsson og Peter Torssander. (2003). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, VI.* Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. Skýrla Raunvísindastofnunar, Reykjavík, RH-03-2003. 86 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir, Bergur Sigfússon, Sverrir Óskar Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Ásgeir Gunnarsson, Einar Örn Hreinsson og Peter Torssander. (2004). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, VII.* Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. RH-06-2004, 40 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir, Bergur Sigfússon, Sverrir Óskar Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Ásgeir Gunnarsson, Bjarni Kristinsson, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2005). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi VIII.* Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. RH-11-2005, 46 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Eydís Salome Eiríksdóttir, Sverrir Óskar Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir og Peter Torssander. (2006). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi IX.* Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. RH-05-2006.

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Eydís Salome Eiríksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Kristjana G. Eyþórsdóttir og Svava Björk Þorláksdóttir. (2007). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi X.* Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. RH-12-2007, 52 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir og Eydís Salome Eiríksdóttir. (2017). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XX.* Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar RH-03-2017, 67 bls.

Sigurður Reynir Gíslason, Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Carl-Magnus Mört og Eydís Salome Eiríksdóttir. (2018). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XXI.* Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. Raunvísindastofnun Háskólangs, Reykjavík, RH-10-2018.

Sigurður Reynir Gíslason, Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Carl-Magnus Mört og Eydís Salome Eiríksdóttir. (2019). *Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XXII.* Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. Raunvísindastofnun Háskólangs, Reykjavík, RH-03-2019. 63 bls.

Snævarr Örn Georgsson. (2016). *Samspil grunnvatns og rennsli Tungnaár.* Mastersritgerð við Háskóla Íslands, 71 bls.

Stumm, W. og J. Morgan. (1996). *Aquatic Chemistry. Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*, 3rd ed. John Wiley & sons, New York, 1022 bls.

Svanur Pálsson og Guðmundur H. Vigfússon. (1996). *Gagnasafn aurburðarmælinga 1963–1995*, Orkustofnun OS-96032/VOD-05 B, 270 bls.

**VIÐAUKI  
TÖFLUR OG MYNDIR**

Tafla 1a. Langtíma meðalefnasamsetning og langtíma meðalrennslí vaktaðra straumvatna á Suðurlandi til ársins 2021. Niðurstöðurnar byggja á mælingum frá 1996 (Þjórsá og Ölfusá) og 1998 (Sog) (byggt á gögnum í eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020).

Vatnsfall	Rennsli*	Vatns-	Loft-	pH	Leiðni	SiO <sub>2</sub>	Na	K	Ca	Mg	Alkalinity <sup>a</sup>	DIC	S-total	SO <sub>4</sub>	$\delta^{34}\text{S}$ <sup>b</sup>	$\delta^{33}\text{S}$ <sup>c</sup>	Cl	F		
	m <sup>3</sup> /sek	hiti °C	hiti °C		μS/sm	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	meq/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	%	%	μmól/l	μmól/l		
<b>Sog</b>	107	6,4	7,7	7,71	72,4	186	371	15,1	103	58,0	0,485	490	23,5	23,0	8,70	5,02	177	3,65		
Ölfusá	379	5,2	6,4	7,49	68,7	229	342	13,8	101	59,5	0,476	500	25,7	25,1	7,97	4,63	146	4,34		
Þjórsá	358	5,0	6,6	7,60	79,2	223	414	13,2	122	72,4	0,582	600	57,9	57,6	3,11	1,80	108	8,38		
<b>Heimsmeðaltal</b>						0,173	0,224	0,033	0,334	0,138		0,853	0,09	0,09		0,162	5,26			
<b>Umhverfismörk II</b>																				
<b>WHO Guidelines</b>																	79			
<hr/>																				
Vatnsfall	TDS mælt	TDS reikn	DOC	POC	PON	C/N	Svifaur	P <sub>total</sub>	TDP	DIP	DOP	DIP/DOP	TDN	N <sub>total</sub>	NO <sub>3</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NH <sub>4</sub> -N	DIN	DON	DIN/DON
	mg/l	mg/l	mmól/l	μg/kg	μg/kg	mól	mg/l	μmól/l		μmól/l	μmól/l			μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l		
<b>Sog</b>	52	64	0,028	279	34,6	11,2	12,0	0,316	0,244	0,073	4,34	<3,30	<0,445	<0,052	<0,494	0,99	2,31	0,429		
Ölfusá	55	65	0,034	543	59,2	12,4	49,8	0,385	<0,281	0,104	3,70	4,50	<1,76	<0,068	<0,751	2,58	1,92	1,34		
Þjórsá	63	74	0,028	367	<38,6	12,2	99	0,843	0,757	0,086	9,8	<3,56	<1,43	<0,067	<0,633	2,13	1,43	1,49		
<b>Heimsmeðaltal</b>	100	100					0,323				0,67		7,14	0,065	1,14	8,57	18,6	0,46		
<b>Umhverfismörk II</b>													54							
<b>WHO Guidelines</b>													806	65,2						
<hr/>																				
Vatnsfall	Al	Fe	B	Mn	Sr	As	Ba	Cd <sup>d</sup>	Co	Cr	Cu	Ni	Pb <sup>d</sup>	Zn	Hg	Mo	Ti	V <sup>e</sup>		
	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	nmól/l	μmól/l		
<b>Sog</b>	0,370	0,260	<0,662	0,032	0,062	1,47	0,852	<0,021	<0,227	16,4	2,97	2,26	<0,085	<10,4	<0,015	1,51	2,43	0,328		
Ölfusá	0,812	1,17	0,503	0,120	0,070	1,08	0,912	0,032	0,574	11,6	5,54	3,30	0,113	16,3	<0,01	2,19	30,8	0,256		
Þjórsá	0,634	0,336	<0,990	0,067	0,068	<1,31	0,630	<0,023	0,351	4,14	4,27	2,79	0,091	<8,73	<0,012	4,26	28,0	0,272		
<b>Heimsmeðaltal</b>	1,85	0,716		1,85	0,716												209			
<b>Umhverfismörk II</b>						67		0,9		96	47	256	4,8	306						
<b>WHO Guidelines</b>	222	7,28		133	9470	26,7		962	31.500	1190	48,3	45.900	29,9	730						

Sog, n = 111; Ölfusá, n = 136; Þjórsá, n = 136. Rennsli\* langtíma meðalrennslí frá 1996 til 2021 (Ölfusá, Þjórsá) og 1998 til 2021 (Sog).

<sup>a</sup> Alkalinity eða basavirkni, <sup>b</sup> gögn fyrir  $\delta^{34}\text{S}$  eru frá 1998–2017, <sup>c</sup> gögn fyrir  $\delta^{33}\text{S}$  eru frá 2012–2017, <sup>d</sup> gögnum frá ágúst 2006 til febrúar 2007 sleppt, <sup>e</sup> Vanadium (V) frá 2004,

Umhverfismörk II fyrir málma, næringarefni og lífrænt kolefni í yfirborðsvatni til verndar líffríki (flokkur B – Litið snortið vatn, [www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999](http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999))

Upplýsingar um styrk DOC, POC og PON ná aðeins til ársins 2019.

Tafla 1b. Meðaltal mælinga sem gerðar voru í ám á Suðurlandi árið 2021.

Vatnsfall	Rennsli*	Vatns-hiti °C	Loft-hiti °C	pH	Leiðni μS/sm	SiO <sub>2</sub> μmól/l	Na μmól/l	K μmól/l	Ca μmól/l	Mg μmól/l	Alkalinity meq/l	DIC μmól/l	S-total μmól/l	SO <sub>4</sub> μmól/l	δ <sup>34</sup> S ‰	δ <sup>33</sup> S ‰	Cl μmól/l	F μmól/l	
	m <sup>3</sup> /sek											ICP-OES I.C							
<b>Sog</b>	98	5,7	8,3	7,63	75,1	169	396	15,2	103	56,1	0,477	476	20,9			180	4,14		
Ölfusá	358	4,9	7,0	7,48	75,8	228	370	13,9	104	60,6	0,489	488	24,1			148	4,53		
Pjórsá	331	4,1	5,0	7,58	85,3	229	464	13,1	129	72,6	0,622	621	62,5			107	7,97		
<b>Heimsmeðaltal</b>					0,173	0,224	0,033	0,334	0,138		0,853	0,09	0,09			0,162	5,26		
<b>Umhverfismörk II</b>																			
<b>WHO Guidelines</b>																79			
Vatnsfall	TDS mælt mg/l	TDS reikn mg/l	DOC mmól/l	POC µg/kg	PON µg/kg	C/N mól	TOC mg/l	Svifaur mg/l	P <sub>total</sub> µmól/l	PO <sub>4</sub> -P µmól/l	P <sub>tot-DIP</sub> µmól/l	DIP/DOP	TDN N <sub>total</sub> µmól/l	NO <sub>3</sub> -N µmól/l	NO <sub>2</sub> -N µmól/l	NH <sub>4</sub> -N µmól/l	DIN µmól/l	DON µmól/l	DIN/DON
<b>Sog</b>	49	62					0,650	10,6	0,279	0,271	0,008	36,8	<2,07	<0,435	<0,042	<0,372	0,849	1,22	0,70
Ölfusá	51	65					1,600	17,3	0,330	0,228	0,101	3,25	<3,20	<1,34	<0,034	<0,227	1,60	1,60	1,00
Pjórsá	64	79					0,670	45	0,861	0,693	0,168	5,12	2,93	<1,21	<0,036	<0,210	1,46	1,47	0,99
<b>Heimsmeðaltal</b>							0,323				0,67		7,14	0,065	1,14	8,57	18,6	0,46	
<b>Umhverfismörk II</b>							3		1,3	0,8		54							
<b>WHO Guidelines</b>												806	65,2						
Vatnsfall	Al µmól/l	Fe µmól/l	B µmól/l	Mn µmól/l	Sr µmól/l	As nmól/l	Ba nmól/l	Cd nmól/l	Co nmól/l	Cr nmól/l	Cu nmól/l	Ni nmól/l	Pb nmól/l	Zn nmól/l	Hg nmól/l	Mo nmól/l	Ti nmól/l	V µmól/l	
<b>Sog</b>	0,258	0,287	0,642	0,027	0,066	2,32	0,914	<0,018	<0,233	16,5	2,61	3,06	<0,048	<3,99	<0,014	1,41	<2,28	0,320	
Ölfusá	0,725	1,37	0,491	0,130	0,081	2,985	0,930	<0,018	0,812	11,64	4,93	3,05	<0,049	6,83	<0,022	2,21	30,5	0,258	
Pjórsá	0,668	0,420	0,977	0,062	0,075	2,26	0,501	<0,033	0,879	5,42	4,24	3,00	<0,048	4,20	<0,016	4,52	36,4	0,291	
<b>Heimsmeðaltal</b>	1,85	0,716		1,85	0,716											209			
<b>Umhverfismörk II</b>						67		0,9		96	47	256	4,8	306					
<b>WHO Guidelines</b>	222	7,28		133	9470	26,7		962		31.500	1190	48,3	45.900	29,9	730				

\*meðalrennsli fyrir vatnsárið 2020 til 2021.

Umhverfismörk II fyrir málma, næringarefni og lífrænt kolefni í yfirborðsvatni til verndar lífríki (flokkur B – Litið snortið vatn, [www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999](http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999))

Upplýsingar um styrk DOC, POC og PON eru aðeins aðgengilegar til ársins 2019

Tafla 2a. Árlegur framburður straumvatna á Suðurlandi (tonn/ár). Gagnaraðir úr Ölfusá og Þjórsá frá 1996 til 2021, og úr Sogi frá 1998 til 2021 (byggt á gögnum í eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019; Deirdre Clark o.fl. 2020).

Vatnsfall	Rennsli* m <sup>3</sup> /s	SiO <sub>2</sub>		Na		K		Ca		Mg		DIC		S total ICP-OES		SO <sub>4</sub> IC		Cl		F		TDS mælt		TDS reiknað		DOC	
		IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC
Sog við Þrastarlund	98	31.184	28.027	1.827	12.727	4.188	64.449			6.201	19.616	240	148.956	191.655													
Ölfusá við Selfoss	352	153.322	96.296	6.613	47.016	16.381	251.360			28.274	56.678	1.038	620.004	748.386													
Þjórsá við Urriðafoss	358	145.932	111.899	5.640	58.518	18.634	299.243			59.951	36.460	1.817	669.967	847.142													
Samtals Ölfusá og Þjórsá	710	299.254	208.195	12.253	105.534	35.015	550.602			88.225	93.138	2.856	1.289.971	1.595.528													
		POC	TOC	Svifaur	P	PO <sub>4</sub> -P	NO <sub>3</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NH <sub>4</sub> -N	N <sub>tot</sub>	Al	Fe	B*	Mn	Sr												
Sog við Þrastarlund		1.660	34.684	26,8	38,7	47,3	1,6	15,2	91,9	21,1	49,7	22,0	4,7	17,8													
Ölfusá við Selfoss		9.403	472.373	103	94,7	431	8,48	136	531	143	610	111	88,1	80,9													
Þjórsá við Urriðafoss		5.895	1.192.795	282	274	291	6,25	36,6	259	253	324	120	43,3	63,7													
Samtals Ölfusá og Þjórsá		15.298	1.665.168	385	368	722	15	173	790	396	935	232	131	145													
		As	Ba	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	Mo	Ti	V	Pungmálmar												
Sog við Þrastarlund		0,37	0,40	0,007	0,044	2,94	0,528	0,359	0,061	3,50	0,007	0,668	0,260	56,3	9,1												
Ölfusá við Selfoss		0,83	1,25	0,022	0,396	6,39	3,57	1,45	0,201	6,49	0,023	2,66	8,32	132	31,6												
Þjórsá við Urriðafoss		1,56	0,77	0,023	0,260	2,20	2,59	1,30	0,189	4,24	0,023	4,86	28	148	46,5												
Samtals Ölfusá og Þjórsá		2,39	2,02	0,045	0,656	8,59	6,15	2,75	0,391	10,7	0,046	7,52	36,8	280	78												

skáletraðar tölur tákna framburð sem er minni en tölugildið segir til um.

\*Rennsli vatnsárin 2018 - 2020 (Gagnagrunnur Veðurstofu Íslands, 2021)

þungmálmar eru As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Mo og Ti. V er ekki reiknað með þungmálum.

ekki eru neinar greiningar á DOC, POC eða PON fyrir árið 2020. Framburður TOC er birtur hér í staðin

Tafla 2b. Framburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi (tonn/ár) á árinu 2021.

Vatnsfall	Rennsli*	SiO <sub>2</sub>	Na	K	Ca	Mg	DIC	S total	SO <sub>4</sub>	Cl	F	TDS	TDS	DOC
Sog við Þrastarlund	102	31.745	29.769	1.995	13.275	4.474	69.660		7.228	19.795	238	187.910	203.250	
Ölfusá við Selfoss	352	153.322	96.296	6.613	47.016	16.381	251.360		28.274	56.678	1.038	620.004	748.386	5.788
Þjórsá við Urriðafoss	358	145.932	111.899	5.640	58.518	18.634	299.243		59.951	36.460	1.817	669.967	847.142	6.351
Samtals Ölfusá og Þjórsá	710	299.254	208.195	12.253	105.534	35.015	550.602		88.225	93.138	2.856	1.289.971	1.595.528	12.139
POC	TOC	Svifaur	P	PO <sub>4</sub> -P	NO <sub>3</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NH <sub>4</sub> -N	N <sub>tot</sub>	Al	Fe	B*	Mn	Sr	
Sog við Þrastarlund		1.239	32.146	34,2	25,4	10,4	1,9	12,6	130,5	20,3	57,0	23,4	5,1	19,0
Ölfusá við Selfoss		8.979	472.373	103	94,7	431	8,48	136	531	143	610	111	88,1	80,9
Þjórsá við Urriðafoss		5.540	1.631.666	282	274	291	6,25	36,6	259	253	324	120	43,3	63,7
Samtals Ölfusá og Þjórsá		14.519	2.104.039	385	368	722	15	173	790	396	935	232	131	145
As	Ba	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	Mo	Ti	V	Þungmálmar	
Sog við Þrastarlund	0,37	0,40	0,007	0,044	2,94	0,528	0,359	0,061	3,50	0,007	0,668	0,260	56,3	9,1
Ölfusá við Selfoss	0,83	1,25	0,022	0,396	6,39	3,57	1,45	0,201	6,49	0,023	2,66	8,32	132	31,6
Þjórsá við Urriðafoss	1,56	0,77	0,023	0,260	2,20	2,59	1,30	0,189	4,24	0,023	4,86	28	148	46,5
Samtals Ölfusá og Þjórsá	2,39	2,02	0,045	0,656	8,59	6,15	2,75	0,391	10,7	0,046	7,52	36,8	280	78

Skáletraðar tölur takna framburð sem er minni en tölgildið segir til um

\*Langtíma meðalrennsli 1998 til 2021 (Gagnagrunnur Veðurstofu Íslands, 2022)

Þungmálmar eru As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Mo og Ti. V er ekki reiknað með þungmálum

Upplýsingar um styrk DOC, POC og PON eru aðeins aðgengilegar til ársins 2019

Tafla 3. Niðurstöður mælinga á rennsli og efnastyrk í Sogi, Ölfusá og Þjórsá í tímaröð árið 2021: Styrkur aðalefna, næringarefna og snefilefna, lífræns kolefnis (TOC) og ólifræns svifaurs.

Sýnanúmer	Vatnsfall	Dags	kl	Loft- hiti		Vatns- hiti		Hleðslu- jafnvægi												Hleðslu- jafnvægi		TOC	Svifaur			
				m³/s	°C	pH	Leiðni	SiO₂	Na	K	Ca	Mg	Alkalinity	DIC	SO₄	Cl	F	μmól/l	meq/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	% skekkja	TDS	TDS reiknað	
20210317-10:30	Þjórsá	17.3.2021	10:30	338	8	2,6	7,53	87,0	217	478	14,4	125	76	0,587	586	57,4	125	7,3	0	3,5	60	77	0,810	20,600		
20210317-13:30	Sog	17.3.2021	13:30	111,66	8	3,4	7,61	73,0	159	387	15,6	101	54	0,450	449	23,5	179	3,4	0	2,4	44	60	0,670	31,700		
20210317-14:30	Ölfusá	17.3.2021	14:30	378	8	4,2	7,47	77,5	203	348	14,6	94	53	0,425	424	23,4	152	3,8	0	2,2	54	59	1,100	16,000		
20210701-10:10	Ölfusá	1.7.2021	10:10	354	11	11,3	7,54	69,2	218	336	12,7	102	57	0,461	460	26,6	130	5,0	0	1,3	48	62		16,20		
20210701-11:30	Þjórsá	1.7.2021	11:30	371	12	11,0	7,63	78,8	215	399	12,1	117	63	0,546	545	63,1	95,3	8,3	0	0,4	71	71	0,540	65,60		
20210701-13:55	Sog	1.7.2021	13:55	89,28	15	10,6	7,66	75,7	169	390	14,7	107	57	0,472	471	19,6	179	4,8	0	2,6	53	62	0,430	4,00		
20211006-10:20	Þjórsá	6.10.2021	10:20	337	4	2,7	7,57	87,7	239	457	12,4	134	70	0,622	621	63,0	102	8,2	0	1,1	60	79	0,290	68,40		
20211006-11:50	Ölfusá	6.10.2021	11:50	345	3,9	7,57	78,2	245	395	13,9	112	67	0,541	540	24,6	149,7	4,8	0	1,4	56	70	0,260	20,80			
20211006-14:00	Sog	6.10.2021	14:00	94,5	8	6,6	7,76	76,5	174	415	15,1	103	57	0,494	493	20,2	180	4,3	0	2,1	52	64	0,130	4,80		
20211208-10:45	Sog	8.12.2021	10:45	109	2	2,2	7,49	75,1	174	394	15,2	102	57	0,493	492	20,2	180	4,17	0	0,6	46	63	0,850	1,90		
20211208-12:30	Þjórsá	8.12.2021	12:30	198	-4	0,0	7,57	87,5	245	522	13,6	140	82	0,734	733	66,5	105	8,04	0	0,0	66	89	0,660	26,00		
20211208-13:30	Ölfusá	8.12.2021	13:30	309	2	0,3	7,35	78,4	246	400	14,2	110	66	0,529	528	21,8	161	4,61	0	1,9	46	70	2,100	16,10		

Sýnanúmer	Vatnsfall	Dags	kl	uppleyst næringarefni																				V				
				μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	nmól/l														
20210317-10:30	Þjórsá	17.3.2021	10:30	0,956	0,903	0,903	1,21	<0,04	<0,21	5,50	0,452	0,471	1,156	0,061	0,080	1,922	0,507	<0,018	0,855	5,1	5,40	4,12	<0,048	4,60	0,026	4,32	21,93	0,296
20210317-13:30	Sog	17.3.2021	13:30	0,321	0,387	0,32	0,31	<0,04	<0,21	3,21	0,271	0,433	0,654	0,037	0,065	1,14	1,100	<0,018	0,406	14,5	3,12	3,27	<0,048	4,88	0,053	1,42	3,13	0,304
20210317-14:30	Ölfusá	17.3.2021	14:30	0,352	0,387	0,258	2,07	<0,04	<0,21	6,07	0,478	2,059	0,433	0,092	0,073	1,33	0,859	<0,018	0,545	10,6	7,74	3,58	<0,048	12,19	0,051	1,80	17,15	0,228
20210701-10:10	Ölfusá	1.7.2021	10:10	0,329	0,613	0,274	<0,14	<0,02	<0,21	<1,43	1,119	1,006	0,369	0,0495	0,078	1,29	1,216	<0,018	0,389	12,4	4,60	2,32	<0,048	<3,06	0,019	1,99	45,53	0,277
20210701-11:30	Þjórsá	1.7.2021	11:30	0,691	0,935	0,774	<0,14	0,0321	<0,21	<1,43	0,574	0,136	0,681	0,0229	0,068	1,57	0,404	<0,018	0,125	3,5	3,34	2,37	<0,048	3,75	0,017	4,04	17,25	0,251
20210701-13:55	Sog	1.7.2021	13:55	0,258	0,516	0,232	<0,14	0,0393	0,8571	<1,43	0,349	0,229	0,523	0,0172	0,066	1,22	0,721	<0,018	<0,085	17,2	2,31	2,56	<0,048	<3,06	0,023	1,34	1,83	0,357
20211006-10:20	Þjórsá	6.10.2021	10:20	0,762	0,355	0,255	1,356	0,0228	<0,21	1,57	1,175	0,847	0,980	0,070	0,073	1,775	0,750	0,077	0,886	8,8	5,43	2,85	<0,048	<3,06	<0,01	4,77	92,11	0,285
20211006-11:50	Ölfusá	6.10.2021	11:50	0,289	0,355	0,187	<0,14	<0,02	0,278	<1,43	0,586	0,827	0,561	0,111	0,087	1,468	0,719	<0,018	0,329	10,3	3,82	3,88	<0,048	5,40	<0,01	2,58	30,91	0,249
20211006-14:00	Sog	6.10.2021	14:00	0,247	0,904	0,840	3,213	<0,02	<0,21	<1,43	0,251	0,331	0,735	0,027	0,067	5,486	0,830	<0,018	0,199	17,4	1,94	4,94	<0,048	4,07	<0,01	1,41	<0,02	0,322
20211208-10:45	Sog	8.12.2021	10:45	0,288	0,26	0,26	0,86	0,048	<0,21	2,21	0,162	0,153	0,71	0,029	0,066	1,455	1,005	<0,018	0,244	16,9	3,08	1,45	<0,048	3,96	0,459	1,47	4,14	0,298
20211208-12:30	Þjórsá	8.12.2021	12:30	1,036	0,840	0,840	2,142	0,049	<0,21	3,21	0,471	0,227	1,091	0,094	0,078	3,751	0,342	<0,018	1,649	4,3	2,79	2,66	<0,048	5,38	<0,01	4,96	14,49	0,330
20211208-13:30	Ölfusá	8.12.2021	13:30	0,349	0,194	0,194	3,00	0,055	<0,21	3,86	0,715	1,594	0,603	0,268	0,086	7,848	0,925	<0,018	1,985	13,3	3,56	2,44	0,054	6,68	<0,01	2,46	28,40	0,279

<sup>1</sup> P-total mælt með ICP-MS

<sup>2</sup> P-total mælt með autoanalyser



Mynd 2. Sog við Þrastarlund. Sýnum er safnað af brú við Þrastarlund, svifaurssýnum í aurburðarsýnataka á spili en vatnsefnasýnum er safnað í fötu sem látin er síga niður af brúnni. Mynd t.v. og efri mynd t.h. voru teknar 6. október 2021. Á mynd t.v. má sjá Svövu bjástra við að ná svifaurs sýnatakanum út úr bílum. Neðri myndin t.h. var tekin 8. desember 2021. *Myndir: ESE*


Tafla 4. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Sogs við Þrastarlund 2020-2021.

Sýnanúmer	Dags	kl	Loft- hiti		Vatns- hiti		pH	Leiðni	SiO <sub>2</sub>	Na	K	Ca	Mg	Alkalinity	DIC	SO <sub>4</sub>	Cl	F	Hleðslu- jafnvægi		Hleðslu- jafnvægi		TDS	TDS reiknað	TOC	Svifaur
			m <sup>3</sup> /s	°C	°C	μS/cm	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	meq/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	% skekkja	mg/kg	mg/kg	mg/l	mg/kg			
20200324-14:30	24.3.2020	14:30	103	3	2,3	7,41	74,5	168	416	15,6	101	59	0,463	463	23,8	183	4,0	55	3,78	59	62	0,320	10,9			
20200625-13:55	25.6.2020	13:55	103	12	8,6	7,74	72,9	157	410	15,6	102	58	0,479	479	23,1	167	4,0	50	3,44	62	62	0,370	14,8			
20200917-14:16	17.9.2020	14:16	122	9	9,1	7,89	71,4	167	384	16,0	103	57	0,539	538	22,7	165	3,9	32	2,19	52	65	0,190	8,0			
20201217-13:00	17.12.2020	13:00	98,8	5	2,4	7,51	73,9	164	404	16,2	106	54	0,480	480	24,2	182	3,57	26	1,82	62	63	0,710	6,5			
20210317-13:30	17.3.2021	13:30	111,66	8	3,4	7,61	73,0	159	387	15,6	101	54	0,450	449	23,5	179	3,4	33	2,40	44	60	0,670	31,7			
20210701-13:55	1.7.2021	13:55	89,28	15	10,6	7,66	75,7	169	390	14,7	107	57	0,472	471	19,6	179	4,8	38	2,65	53	62	0,430	4			
20211006-14:00	6.10.2021	14:00	94,5	8	6,6	7,76	76,5	174	415	15,1	103	57	0,494	493	20,2	180	4,3	30	2,06	52	64	0,130	4,8			
20211208-10:45	8.12.2021	10:45	109	2	2,2	7,49	75,1	174	394	15,2	102	57	0,493	492	20,2	180	4,17	9	0,62	46	63	0,850	1,9			

#### uppleyst næringarefni


Sýnanúmer	Dags	kl	P-total	PO <sub>4</sub>	NO <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	NH <sub>4</sub>	N-total	P-total	Al	Fe	B	Mn	Sr	As	Ba	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	Mo	Ti	V
			μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	nmól/l	μmól/l											
20200324-14:30	24.3.2020	14:30	0,352	0,290	<0,14	<0,04	<0,29	2,14	0,323	0,152	0,170	0,558	0,027	0,070	1,66	0,743	<0,018	0,190	15,9	1,72	1,14	<0,05	<3,0	<0,010	1,26	1,76	0,302
20200625-13:55	25.6.2020	13:55	0,286	0,290	<0,14	<0,04	<0,21	3,93	0,323	0,257	0,231	0,589	0,0282	0,068	1,12	0,750	<0,018	0,127	16,8	1,95	1,56	<0,048	<3,06	<0,01	1,29	1,30	0,340
20200917-14:16	17.9.2020	14:16	0,318	0,194	<0,14	<0,04	<0,21	1,43	0,226	0,333	0,645	0,637	0,036	0,068	1,92	0,932	<0,018	0,182	16,7	4,83	3,13	<0,048	<3,06	<0,01	1,31	8,79	0,334
20201217-13:00	17.12.2020	13:00	0,423	0,258	0,529	0,047	0,429	4,43	0,355	0,172	0,156	0,654	0,023	0,065	1,03	0,939	<0,018	<0,085	15,3	2,80	3,48	<0,048	3,65	0,041	1,46	6,24	0,338
20210317-13:30	17.3.2021	13:30	0,321	0,323	0,31	<0,04	<0,21	3	0,387	0,271	0,433	0,654	0,037	0,065	1,14	1,10	<0,018	0,406	14,5	3,12	3,27	<0,048	4,88	0,053	1,42	3,13	0,304
20210701-13:55	1.7.2021	13:55	0,258	0,232	<0,14	0,04	0,9	<1,43	0,516	0,349	0,229	0,523	0,017	0,066	1,22	0,721	<0,018	<0,085	17,2	2,31	2,56	<0,048	<3,06	0,023	1,34	1,83	0,357
20211006-14:00	6.10.2021	14:00	0,247	0,840	3,21	<0,02	<0,21	<1,43	0,904	0,251	0,331	0,735	0,027	0,067	5,49	0,830	<0,018	0,199	17,4	1,94	4,94	<0,048	4,07	<0,01	1,41	<0,02	0,322
20211208-10:45	8.12.2021	10:45	0,288	0,258	0,86	0,05	<0,21	2	0,258	0,162	0,153	0,713	0,029	0,066	1,45	1,00	<0,018	0,244	16,9	3,08	1,45	<0,048	3,96	0,459	1,47	4,14	0,298

### Sogið við Þrastarlund




Mynd 3. Styrkur efna í tímaröð í Sogi við Þrastarlund 1998–2021: Hitastig, svifaur, leyst aðal- og næringarefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

## Sogið við Þrastarlund




Mynd 4. Styrkur efna í tímarröð í Sogi við Þrastarlund 1998–2021: Snefilefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

### Sog við Þrastarlund



Mynd 5. Samband rennslis og efnastyrks í Sogi við Þrastarlund 1998–2021: svifaur og leyst aðalefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

**Sog við Þrastarlund: Bergættuð efni (gögn leiðrétt fyrir úrkomu)**



Mynd 6. Samband rennslis og efnastyrks í Sogi við Þrastarlund 1998–2021: bergættuð, leyst efni (leiðrétt fyrir úrkomu). Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.



A



B



C



D


Mynd 7 A-D. Sýnasöfnun í Ölfusá 6. A) Yfirlitsmynd yfir söfnunarstaðinn 24. ágúst 2020 (mynd: SBÞ). B) Mikið vatn var í ánni þegar safnað var 17. mars 2021 (mynd: SBÞ). Deirdre Clark). C) Svifaursýnin eru tekin með svifaurssýnataka í spili og þarf aðstoð lögreglu við að stjórna umferð á meðan (mynd: ESE). D) Vatnsefnasýnin eru tekin í fötu í af brúnni við Selfoss (mynd: Deirdre Clark)

Tafla 5. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Ölfusár við Selfoss 2020-2021.

Sýnanúmer	Dags	kl	Loft- hiti			Vatns- hiti			Leiðni	SiO <sub>2</sub>	Na	K	Ca	Mg	Alkalinity	DIC	SO <sub>4</sub>	Cl	F	Hleðslu- jafnvægi		Hleðslu- jafnvægi		TDS	TDS reiknað	TOC	NVOC	Svifaur	O <sub>2</sub>	TN ósiuð		TP ósiuð	
			m <sup>3</sup> /s	°C	°C	pH	μS/cm	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	meq/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	% skekkja	mg/kg	mg/kg	mg/l	mg/l	mg/kg	%	mg/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l			
20200324-10:15	24.3.2020	10:15	390	2,5	0,6	6,94	77,4	215	411	17,1	98	65	0,407	406	27,7	219	3,7	55	3,78	67	63	0,980	0,740	35,1	96,0	13,5	34,3	0,903					
20200625-09:55	25.6.2020	09:55	437	13	10,2	7,49	63,6	213	347	12,4	95	58	0,441	440	24,8	118	4,6	50	3,44	60	59	0,610		21,9									
20200917-09:25	17.9.2020	09:25	411	10	8,0	7,52	73,2	231	368	15,3	113	69	0,526	525	28,3	130	4,7	32	2,19	56	68	0,470		65,1									
20201217-14:10	17.12.2020	14:10	270	5	2,3	7,43	79,7	236	410	15,5	113	64	0,501	501	27,5	169	4,17	26	1,82	57	69	1,100		63,4									
20210317-14:30	17.3.2021	14:30	378	8	4,2	7,47	77,5	203	348	14,6	94	53	0,425	424	23,4	152	3,8	28	2,20	54	59	1,100		16									
20210701-10:10	1.7.2021	10:10	354	11	11,3	7,54	69,2	218	336	12,7	102	57	0,461	460	26,6	130	5,0	17	1,26	48	62			16,2									
20211006-11:50	6.10.2021	11:50	345		3,9	7,57	78,2	245	395	13,9	112	67	0,541	540	24,6	150	4,8	21	1,38	56	70	0,260		20,8									
20211208-13:30	8.12.2021	13:30	309	2	0,3	7,35	78,4	246	400	14,2	110	66	0,529	528	21,8	161	4,61	28	1,87	46	70	2,100		16,1									


Sýnanúmer	Dags	kl	uppleyst næringarefni																		Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	Mo	Ti	V
			μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l									
20200324-10:15	24.3.2020	10:15	0,292	0,323	3,21	0,0714	2,57	8,57	0,323	0,313	1,651	0,479	0,208	0,087	<0,67	0,816	<0,018	1,089	6,0	5,82	2,83	<0,05	3,38	<0,010	1,68	12,59	0,173		
20200625-09:55	25.6.2020	09:55	0,306	0,129	<0,14	<0,04	<0,21	3,29	0,161	1,030	0,851	0,406	0,0681	0,078	1,28	0,910	<0,018	0,597	8,6	5,35	1,87	<0,048	<3,06	<0,01	1,77	55,35	0,245		
20200917-09:25	17.9.2020	09:25	0,245	0,161	<0,14	<0,04	0,286	2,07	0,161	0,460	0,578	0,471	0,140	0,091	0,886	0,859	<0,018	0,611	9,3	6,11	2,28	<0,048	<3,06	<0,01	2,28	11,76	0,228		
20201217-14:10	17.12.2020	14:10	0,362	0,258	2,21	0,059	0,714	6,29	0,355	0,682	1,862	0,433	0,120	0,084	0,904	1,165	<0,018	0,400	12,5	4,72	3,20	<0,048	3,64	0,014	2,40	37,80	0,263		
20210317-14:30	17.3.2021	14:30	0,3519	0,258	2,07	<0,04	<0,21	6,07	0,387	0,478	2,06	0,433	0,092	0,073	1,33	0,859	<0,018	0,545	10,6	7,74	3,58	<0,048	12,2	0,051	1,80	17,1	0,228		
20210701-10:10	1.7.2021	10:10	0,3293	0,274	<0,14	<0,02	<0,21	<1,43	0,613	1,12	1,01	0,369	0,050	0,078	1,29	1,22	<0,018	0,389	12,4	4,60	2,32	<0,048	<3,06	0,019	1,99	45,5	0,277		
20211006-11:50	6.10.2021	11:50	0,2893	0,187	<0,14	<0,02	0,3	<1,43	0,355	0,586	0,827	0,561	0,111	0,087	1,47	0,719	<0,018	0,329	10,3	3,82	3,88	<0,048	5,40	<0,01	2,58	30,9	0,249		
20211208-13:30	8.12.2021	13:30	0,3487	0,194	3,00	0,05	<0,21	3,86	0,194	0,715	1,59	0,603	0,268	0,086	7,85	0,925	<0,018	1,985	13,3	3,56	2,44	0,054	6,68	<0,01	2,46	28,4	0,279		

## Ölfusá við Selfoss




Mynd 8. Styrkur efna í tímaröð í Ölfusá við Selfoss 1996–2021: Svifaur, leyst aðalefni og næringarefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

## Ölfusá við Selfoss



Mynd 9. Styrkur efna í tímarröð í Ölfusá við Selfoss 1996–2021: Snejilefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.


### Ölfusá við Selfoss



Mynd 10. Samband rennslis og efnastyrks í Ölfusá við Selfoss 1996–2021: svifaur og leyst aðalefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

## Ölfusá við Selfoss

Bergættuð efni (gögn leiðrétt fyrir úrkomu)



Mynd 11. Samband rennslis og efnastyrks í Ölfusá við Selfoss 1996–2021: bergættuð, leyst efni (leiðrétt fyrir úrkomu). Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.



A



B



C



D


Mynd 12 A-D. Sýnasöfnun í Þjórsá A og C) 8. desember 2021. B) 6. október 2021. D) 1. júlí 2021. Sýnum úr Þjórsá er safnað af bakka undir gömlu brú á þjóðvegi nr. 1.

Tafla 6. Efnasamsetning, rennsli og aurburður þjórsár við Urriðafoss 2020-2021

Sýnanúmer	Dags	kl	Loft-		Vatns-			Hleðslu-		Hleðslu-																		
			Rennsli	hití	hití	pH	Leiðni	SiO <sub>2</sub>	Na	K	Ca	Mg	Alkalinity	DIC	SO <sub>4</sub>	Cl	F	jafnvægi	jafnvægi	TDS	TDS reiknað	TOC	N VOC	Svifaur	O <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	sýni	sýni
			m <sup>3</sup> /s	°C	°C	μS/cm	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	meq/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	% skekkja	mg/kg	mg/kg	mg/l	mg/l	mg/kg	%	mg/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l
20200324-11:30	24.3.2020	11:30	302	2	0,2	7,48	98,0	238	565	15,5	135	89	0,676	675	67,8	134	8,9	76	3,81	62	87	0,540	0,370	20,4	98,0	14,4	1,57	1,387
20200625-11:15	25.6.2020	11:15	485	13	10,2	7,58	69,1	207	366	12,9	106	60	0,430	430	61,9	85,4	9,8	61	4,49	70	62	0,380		59,2				
20200917-11:25	17.9.2020	11:25	308	11	9,0	7,62	87,1	228	435	14,5	134	74	0,624	623	61,2	91,2	9,4	21	1,21	69	78	0,450		41,0				
20201217-10:15	17.12.2020	10:15	321	4	0,6	7,58	94,6	232	526	14,0	136	82	0,670	669	66,5	113	7,92	53	2,78	68	85	0,700		16,0				
20210317-10:30	17.3.2021	10:30	338	8	2,6	7,53	87,0	217	478	14,4	125	76	0,587	586	57,4	125	7,3	0	3,50	60	77	0,810		20,6				
20210701-11:30	1.7.2021	11:30	371	12	11,0	7,63	78,8	215	399	12,1	117	63	0,546	545	63,1	95,3	8,3	0	0,37	71	71	0,540		65,6				
20211006-10:20	6.10.2021	10:20	337	4	2,7	7,57	87,7	239	457	12,4	134	70	0,622	621	63,0	101,6	8,2	0	1,09	60	79	0,290		68,4				
20211208-12:30	8.12.2021	12:30	198	-4	0,0	7,57	87,5	245	522	13,6	140	82	0,734	733	66,5	105	8,04	0	0,04	66	89	0,660		26,0				


Sýnanúmer	Dags	kl	uppleyst næringarefni																								
			P-total	PO <sub>4</sub>	NO <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	NH <sub>4</sub>	N-total	P-total	Al	Fe	B	Mn	Sr	As	Ba	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	Mo	Ti	V
			μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	μmól/l	nmól/l												
20200324-11:30	24.3.2020	11:30	0,985	1,00	1,21	0,0464	0,571	2,00	0,871	0,299	0,261	0,934	0,085	0,090	1,86	0,367	<0,018	0,290	4,85	3,05	1,72	<0,05	<3,0	<0,010	4,51	9,00	0,328
20200625-11:15	25.6.2020	11:15	0,701	0,710	<0,14	<0,04	<0,21	2,79	0,613	0,493	0,108	0,912	0,0328	0,068	1,78	0,338	<0,018	0,164	1,94	2,14	1,22	<0,048	<3,06	<0,01	3,53	13,9	0,202
20200917-11:25	17.9.2020	11:25	0,823	0,871	<0,14	<0,04	<0,21	<1,43	2,194	0,523	0,093	0,971	0,087	0,072	1,52	0,408	<0,018	0,295	3,40	7,38	2,13	<0,048	10,2	<0,01	4,21	5,37	0,281
20201217-10:15	17.12.2020	10:15	1,094	1,13	1,57	0,058	1,00	4,64	1,10	0,838	0,510	1,21	0,054	0,082	1,52	0,566	0,023	0,288	6,00	3,93	3,34	<0,048	4,10	<0,01	4,91	65,4	0,349
20210317-10:30	17.3.2021	10:30	0,956	0,903	1,21	<0,04	<0,21	5,50	0,903	0,452	0,471	1,16	0,061	0,080	1,92	0,507	<0,018	0,855	5,10	5,40	4,12	<0,048	4,60	0,026	4,32	21,9	0,296
20210701-11:30	1.7.2021	11:30	0,691	0,774	<0,14	0,032	<0,21	<1,43	0,935	0,574	0,136	0,681	0,023	0,068	1,57	0,404	<0,018	0,125	3,54	3,34	2,37	<0,048	3,75	0,017	4,04	17,3	0,251
20211006-10:20	6.10.2021	10:20	0,762	0,255	1,36	0,023	<0,21	1,57	0,355	1,17	0,847	0,980	0,070	0,073	1,78	0,750	0,077	0,886	8,77	5,43	2,85	<0,048	<3,06	<0,01	4,77	92,1	0,285
20211208-12:30	8.12.2021	12:30	1,036	0,840	2,14	0,049	<0,21	3,21	0,840	0,471	0,227	1,09	0,094	0,078	3,75	0,342	<0,018	1,65	4,29	2,79	2,66	<0,048	5,38	<0,01	4,96	14,5	0,330

## Pjórsá við Urriðafoss




Mynd 13. Styrkur efna í tímaröð í Pjórsá við Urriðafoss 1996–2021 . Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

## Þjórsá við Urriðafoss



Mynd 14. Styrkur efna tímaröð í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021: Snefilefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.


## Þjórsá við Urriðafoss



Mynd 15. Samband rennslis og efnastyrks í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021: svifaur og leyst aðalefni. Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

## Þjórsá við Urriðafoss

Bergættuð efni (gögn leiðrétt fyrir úrkomu)



Mynd 16. Samband rennslis og efnastyrks í Þjórsá við Urriðafoss 1996–2021: bergættuð efni (leiðrétt fyrir úrkomu). Gögn eldri en frá 2020 eru úr eldri skýrslum t.d. Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2019.

Tafla 7. Efri umhverfismörk málma og næringarefna í hverjum umhverfisflokkum til verndar lífríki í yfirborðsvatni samkvæmt reglugerð 796/1999 ([www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999](http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/796-1999))

A. Efri umhverfismörk málma og næringarefna í yfirborðsvatni til verndar lífríki					
Málmar í yfirborðsvatni		A	B	C	D
Kopar	nmól/l	<7,6	47	142	708
Zink	nmól/l	<76	306	918	4589
Kadmíum	nmól/l	<0,1	0,9	2,7	>13,3
Blý	nmól/l	<1,0	4,8	14,5	>72
Króm	nmól/l	<5,8	96	288	1442
Nikkel	nmól/l	<12	256	767	3833
Arsenik	nmól/l	<5,3	67	200	>1001
Næringarefni í ám					
P-total	µmól/l	<0,6	1,3	2,9	>4,8
PO <sub>4</sub> -P	µmól/l	<0,3	0,8	1,6	>3,2
NH <sub>3</sub>	µmól/l	<0,6	1,5	5,9	>14,7
N-total	µmól/l	<21	54	107	>178

Tafla 8. Vatnsgæði í Sogi, Ölfusá og Þjórsá árið 2021 byggt á meðalefnastyrk þeirra efna sem miðað er við í reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999. Sjá mörk flokka og litamerkingu í töflu 7.

		Sog	Ölfusá	Þjórsá
P <sub>total</sub>	µmól/l	0,345	0,301	0,901
PO <sub>4</sub> -P	µmól/l	0,258	0,218	0,927
N <sub>total</sub>	µmól/l	<2,98	5,05	2,71
As	nmól/l	1,43	0,93	1,67
Cd	nmól/l	<0,018	<0,018	<0,019
Cr	nmól/l	16,2	9,09	4,05
Cu	nmól/l	2,82	5,50	4,13
Ni	nmól/l	2,33	2,55	2,10
Pb	nmól/l	<0,048	0,048	<0,048
Zn	nmól/l	<3,21	3,28	5,10

Tafla 9. Ástand vaktaðra straumvatna á Suðurlandi 2021 m.t.t. eðlisefnafræðilegra gæðapáttu miðað við viðmið sem gefin eru upp í skýrslu fagstofnanna (Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2020). Blár litur táknað mjög gott (náttúrulegt) ástand.

Vatnsfall	Sog	Ölfusá	Þjórsá
Vatnagerð	RL2	RL2	RG
Vatnshlotanr.	104-897-R	103-975-R	103-663-R
pH	7,63	7,35	7,57
Leiðni	µS/sm	75,1	73,5
Alkalinity	meq/l	0,477	0,469
PO <sub>4</sub> -P	µmól/l	0,271	0,218
NO <sub>3</sub> -N	µmól/l	<0,435	<1,43
NH <sub>4</sub> -N	µmól/l	<0,372	<0,943

Tafla 10. Næmi efnagreiningaraðferða og hlutfallsleg skekkja mælinga.

Efni	Rannsóknar-stofa	Aðferð/Tæki	Einingar	Næmi	Skekja
Leiðni	Hafró	Leiðnimælir	µS/cm		± 1,0
T°C	Hafró	Hitamælir	°C		± 0,1
pH	Hafró	pH mælir			± 0,05
Svifaur	Veðurstofan		mg/l	1,0	
SiO <sub>2</sub>	ALS	ICP-AES	µmól/l	1,07	
Na	ALS	ICP-AES	µmól/l	4,35	
K	ALS	ICP-AES	µmól/l	10,2	
Ca	ALS	ICP-AES	µmól/l	2,50	
Mg	ALS	ICP-AES	µmól/l	3,70	
Alkalinity	Hafró	Tírun	meq/l		3%
CO <sub>2</sub>	Hafró	Jónaskilja	µmól/l		3%
SO <sub>4</sub>	JHÍ	Jónaskilja	µmól/l	10,4	10%
S	ALS	ICP-AES	µmól/l	6,24	
Cl	JHÍ	Jónaskilja	µmól/l	28,2	5%
F	JHÍ	Jónaskilja	µmól/l	1,05	10%
N-NO <sub>2</sub>	ALS	Autoanalyser	µmól/l	0,036	
N-NO <sub>3</sub>	ALS	Autoanalyser	µmól/l	0,14	
N-NH4	ALS	Autoanalyser	µmól/l	0,29	
N-total	ALS	Autoanalyser	µmól/l	1,43	
P-PO <sub>4</sub>	ALS	Autoanalyser	µmól/l	0,03	
P-total	ALS	Autoanalyser	µmól/l	0,1	
P	ALS	ICP-AES	µmól/l	0,032	
Al	ALS	ICP-SFMS	µmól/l	0,007	
B	ALS	ICP-SFMS	µmól/l	0,05/0,93	
Fe	ALS	ICP-SFMS	µmól/l	0,007	
Sr	ALS	ICP-SFMS	µmól/l	0,023	
Ti	ALS	ICP-SFMS	µmól/l	0,001	
Mn	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,546	
As	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,667	
Cr	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,192	
Ba	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,073	
Co	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,085	
Ni	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,852	
Cu	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	1,57	
Zn	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	3,06	
Mo	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,521	
Cd	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,018	
Hg	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,010	
Pb	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,048	
V	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,098	
Th	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,086	
U	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,002	
Sn	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,421	
Sb	ALS	ICP-SFMS	nmól/l	0,082	
TOC	ALS	Skalar Formacs TON/TN	mg/l	0,1	
DOC	Umeå	Carlo Erba 1108	µmól/l	8,0	
DOC	NMÍ		µmól/l	9,0	
POC	NMÍ		µg µg/l <sup>1</sup> µg/l <sup>2</sup>	2,00 10,0 6,67	6,50%
PON	Umeå	Shimadzu TOC5000	µg	1,5	
PON	NMÍ		µg µg/l <sup>1</sup> µg/l <sup>2</sup>	0,40 2,00 1,33	11%
POP	NMÍ		µg µg/l <sup>1</sup> µg/l <sup>2</sup>	0,40 2,00 1,33	

<sup>1</sup>Næmi ef vatnssýni er 200 ml, <sup>2</sup>Næmi ef vatnssýni er 300 ml.

Greiningar hjá ALS eru LOQ. Allar greiningar eru gerðar undir staðlaðri EPA aðferð, nr. 200.7 fyrir ICP-AES og nr. 200.8 fyrir ICP-SFMS.

Hg greiningar með AFS eru gerðar skv. SS-EN ISO 17852:2008.



## HAFRANNSÓKNASTOFNUN

Rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna